

31.3.2004

Raskaudenkeskeytykset – vuoden 2003 ennakkotiedot

Aborter - preliminära uppgifter för 2003

Induced abortions - preliminary data 2003

Hanna Eronen
 +358 9 3967 2346
 hanna.eronen@stakes.fi

Anne Soimula
 +358 9 3967 2359
 anne.soimula@stakes.fi

Mika Gissler
 +358 9 3967 2279
 mika.gissler@stakes.fi

Telefax
 +358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
 kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
 centralen för social- och
 hälsövården

National Research and
 Development Centre for Welfare
 and Health

Puhelin (09) 39 671
 Telefon +358 9 396 71
 Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
 Telefax +358 9 3967 2459


www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)
 ISSN 1459-2347
 (painettu - printed)

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2003 tehtiin 10 643 raskaudenkeskeytystä eli 9,0 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden. Tämä on noin 260 keskeytystä vähemmän kuin vuonna 2002. Väestömäärään suhteutettuna raskaudenkeskeytyksiä tehtiin eniten 20–24 -vuotiaiden ikäryhmässä. Keskeytykset lisääntyivät hieman myös 35–39 -vuotiailla ja 45–49-vuotiailla, mutta vähenivät muissa ikäryhmissä.

Pitkään jatkunut teini-ikäisten raskauden keskeytysten yleistyminen päättyi vuonna 2003. Alle 20-vuotiaiden keskeytyksiä tehtiin 2 375 kpl, mikä on noin 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tämä vastaa vuoden 2000 tasoa. Toukokuun alusta 2001 reseptivapauden saaneen jälkiehkäisyyn vaikutusta ei voi suoraan arvioida keskeytystilastoista. Muita vaihtoehtoisia selityksiä nuorten keskeytysten vähenemiselle on seksuaaliopetuksen paraneminen kouluissa ja kuntien panostus kouluterveydenhuoltoon. Ruotsin alustavien tietojen mukaan myös siellä teini-ikäisten keskeytysten määrä olisi vähentynyt noin 3 prosentilla vuonna 2003. Samankaltaisiin trendeihin voivat vaikuttaa yhteiset kulttuurilliset tekijät.

Kuvio 1: Alle 25-vuotiaiden keskeytykset tuhatta samanikäistä naista kohden 1994–2003. Vuoden 2003 tieto on ennakkotieto.



Asuinkunnan mukaan tarkasteltuna eniten keskeytyksiä suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin tehtiin Helsingin ja Uudenmaan (10,3/1000 15–49 v. naista) sekä Länsi-Pohjan (10,3/1000) sairaanhoitopiireissä ja Ahvenanmaalla (12,0/1000). Alhaisimmat keskeytysluvut olivat Etelä-Pohjanmaalla (6,3/1000) ja Itä-Savossa (6,5/1000).

Eniten keskeytyksiä (87,5 % vuonna 2003) tehtiin ns. sosiaalisella perusteella eli elämänoloista ja muista olosuhteista aiheutuvan huomattavan rasituksen vuoksi. Muita yleisimpiä syitä olivat alle 17 vuoden ikä (6,9 %), yli 40 vuoden ikä (3,7 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,0 %). Vuonna 2003 lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinvasta tai heikkoudesta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi suoritettiin 0,5 prosenttia keskeytyksistä. Mahdollisen tai todetun sikiövaurion vuoksi tehtiin 2,3 prosenttia keskeytyksistä.

Noin 94 % raskaudenkeskeytyksistä suoritettiin ennen 12. raskausviikkoa. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on noussut vuosittain. Vuonna 2003 lääkkeellisiä raskaudenkeskeytyksiä tehtiin noin 33 prosenttia kaikista keskeytyksistä (27 % vuonna 2002). Yleisin keskeytystoimenpide on kuitenkin edelleen laajennus ja imukaavinta, 47 prosenttia vuonna 2003. Noin 64 prosenttia raskaudenkeskeytyspotilaista ilmoitti käyttäneensä jonkinlaista ehkäisymenetelmää raskauden alkaessa. Jälkiehkäisytablettiä oli käyttänyt 2,4 prosenttia.

Vuonna 2003 noin puolella keskeytyspotilaista oli vähintään yksi synnytys. Vähintään yksi aiempi keskeytys oli 31 prosentilla keskeyttäneistä ja vähintään kaksi aiempaa keskeytystä noin 9 prosentilla. Keskeytyspotilaista 20 prosenttia oli naimisissa ja naimattomien osuus oli 72 prosenttia. Eronneita ja leskiä oli 9 prosenttia.

Taulukot

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969–1970, 1975–2003*

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2003*

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2003*

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2003*

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985–2003*

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2003*

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2003*

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989–2003*, %

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 1998–2003*

*) Ennakkotieto.

Lähteet

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja keskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisestä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970.

Keskeytyksiä koskevan lain (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970) sekä sen nojalla annetun asetuksen (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Steriloimisasetus 427/1985) mukaisesti suorittajalääkäri on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja sterilöimisrekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella.

Varhaisempien vuosien tilastot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintölaitos vuosina 1935–1954; Yleinen terveyden- ja sairaanhoito vuosina 1955–1970; Terveydenhuolto vuosina 1971–1987). Vuodesta 1987 lähtien rekisterin tiedot ovat olleet Stakesin tietokannassa. Vuoden 2003 tiedot ovat ennakkotietoja ja perustuvat tilanteeseen 31.3.2004. Lopulliset, tarkastetut tiedot julkaistaan syksyllä 2004.

Ikäryhmittäisessä tarkastelussa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, mutta ennen tätä ikä vuoden lopussa. Tähän julkaisuun on takautuvasti laskettu vuosien 1986-1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä.

Käsitteet ja määritelmät

Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

31.3.2004

Aborter – preliminära uppgifter för 2003

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346
hanna.eronen@stakes.fi

Anne Soimula
+358 9 3967 2359
anne.soimula@stakes.fi

Mika Gissler
+358 9 3967 2279
mika.gissler@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)


ISSN 1459-2347

(painettu - printed)

År 2003 verkställdes enligt preliminära uppgifter 10 643 aborter, dvs. 9,0 per 1 000 fertila kvinnor. Detta är cirka 260 abortingrepp färre än år 2002. I förhållande till befolkningmängden utfördes flest aborter i åldergruppen 20–24 år. Antalet aborter ökade något i åldersgrupperna 35–39 år och 45–49 år. Däremot minskade det i de övriga åldergrupperna.

Tonårsaborter har blivit allt vanligare under en längre tid, men 2003 avstannade denna utveckling. Bland kvinnor under 20 år gjordes 2 375 aborter, vilket är ungefär 8 procent mindre än året innan och motsvarar nivån år 2000. På grundval av abortstatistiken är det inte möjligt att dra några direkta slutsatser om effekten av att akut p-piller blev receptfria från början av maj 2001. Andra möjliga förklaringar till att tonårsaborterna minskat är att sexualundervisningen i skolorna förbättrats och att kommunerna satsat på skolhälsovården. Enligt preliminära uppgifter från Sverige har tonårsaborterna även minskat där med cirka 3 procent år 2003. Gemensamma kulturelement kan ha lett till likartade tendenser.

Figur 1: Verkställda aborter bland kvinnor under 25 år per 1 000 kvinnor i samma ålder 1994–2003. Uppgifterna för 2003 är preliminära.



Om man utgår från hemkommunen, utfördes flest aborter i förhållande till antalet fertila kvinnor i Helsingfors och Nylands (10,3/1 000 kvinnor 15–49 år) samt Västerbottens (10,3/1 000) sjukvårdsdistrikt och på Åland (12,0/1 000). Antalet aborter var lägst i Södra Österbotten (6,3/1 000) och Östra Savolax (6,5/1 000).

Flest aborter (87,5 procent 2003) utfördes på s.k. social indikation, dvs. på grund av betydande belastning för kvinnan med hänsyn till levnadsförhållanden och andra omständigheter. De övriga mest frekventa indikationerna var ålder under 17 år (6,9 procent) eller över 40 år (3,7 procent) och fyra tidigare förlossningar (2,0 procent). År 2003 utfördes 0,5 procent av aborterna på medicinsk indikation, dvs. till följd av sjukdom, kroppslyte eller svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa. Av aborterna utfördes 2,3 procent på grund av möjlig eller konstaterad fosterskada.

Ungefär 94 procent av aborterna gjordes före den 12:e graviditetsveckan. Andelen medicinska aborter har ökat varje år och 2003 användes metoden i 33 procent av alla verkställda aborter (27 procent 2002). Den vanligaste abortmetoden är dock fortfarande vacuumaspiration (47 procent 2003). Cirka 64 procent av abortpatienterna uppgav att de använt någon typ av preventivmedel när graviditeten uppstod. Akut p-piller hade använts av 2,4 procent.

År 2003 hade ungefär hälften av abortpatienterna fött minst ett barn och 31 procent av dem hade genomgått minst ett tidigare abortingrepp och 9 procent minst två. Av abortpatienterna var 20 procent gifta och 72 procent ogifta. Andelen frånskilda och änkor var 9 procent.

Tabeller

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2003*

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2003*

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2003*

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2003*

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2003*

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2003*

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2003*

Tabell 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989–2003*, %

Tabell 9: Abortmetoder 1998–2003*

*) Preliminära uppgifter.

Källor

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970.

Enligt lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) och den förordning som utfärdats med stöd av den (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och 6 § i den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.

Statistik från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en del av den officiella statistiken (Lääkintölaivos [Medicinalverket] 1935–1954), Yleinen terveyden- ja sairaan-

hoito [Allmän hälso- och sjukvård] 1955–1970), Terveystietojen huolto [Hälso- och sjukvård] 1971–1987. Från 1987 har registeruppgifterna funnits i Stakes databas. Uppgifterna för 2003 är preliminära och grundar sig på situationen den 31 mars 2004. De slutgiltiga, granskade uppgifterna offentliggörs under hösten 2004.

När man granskar uppgifter efter åldersgrupp, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I denna publikation har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på ingreppsdagen

Begrepp och definitioner

Abort (avbrytande av havandeskap): En graviditet som har avbrutits artificiellt och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte har dött intrauterint före ingreppet.

31 March 2004

Induced abortions – preliminary data 2003

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346
hanna.eronen@stakes.fi

Anne Soimula
+358 9 3967 2359
anne.soimula@stakes.fi

Mika Gissler
+358 9 3967 2279
mika.gissler@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)


ISSN 1459-2347

(painettu - printed)

According to preliminary data, 10 643 abortions were performed in Finland in 2003, representing 9.0 induced abortions per thousand women of fertile age. This represents some 260 induced abortions less than in 2002. In proportion to the population, most abortions have been performed on women aged between 20 and 24 years. The number of abortions increased slightly among women aged 35 to 39 and 45 to 49. However, in the other age-groups the number of induced abortions declined.

The prolonged trend of abortions becoming more prevalent among teenagers came to an end in 2003. The number of induced abortions performed on women under 20 years was 2 375, i.e. about 8% less than the previous year. This corresponds to the level of year 2000. The effect of post-contraception, which has been available without prescription since the beginning of May 2001, can not be estimated directly on the basis of the statistics on induced abortion. Other possible explanations for the decline of abortions among the youth are improved sexual education at school and the local authorities' input into school health service. According to preliminary information the figure for teenage abortions in Sweden has also declined by about 3% in 2003. The similar trend might be a result of common cultural factors.

Figure 1: Abortions to women less than 25 years per thousand women of the same age 1994–2003. The data of 2003 is preliminary.



When analysed according to patient domicile, most abortions in relation to women of fertile age were performed in the Helsinki and the Uusimaa Hospital Districts (10.3/1 000 women aged 15–49 years), the Länsi-Pohja Hospital District (10.3/1 000) and in the Åland Islands (12.0/1 000). The lowest figures for induced abortions were in Southern Ostrobothnia (6.3/1 000) and Eastern Savo (6.5/1 000).

Most abortions (87.5% in 2003) were performed on social grounds, meaning that the birth of the child would cause considerable strain to the mother in view of her personal circumstances and living conditions. The other most common reasons were the patient being under 17 years old (6.9%), over 40 years old (3.7%), or having given birth to four children already (2.0%). Some 0.5% of induced abortions performed in 2003 were on medical grounds, meaning that the pregnancy would endanger the woman's life or health because of illness, a physical disability or debility. The number of abortions performed because of a potential or detected foetal defect was 2.3%.

Some 94% of the abortions were performed before the end of the twelfth week of gestation. Abortions induced by drugs have increased year by year, accounting for 33% of all induced abortions in 2003 (27% in 2002). The most common types of abortion are still dilation and suction scraping (47% in 2003). Some 64% of the abortion patients said that they had used some kind of contraceptive method when the pregnancy started. Abortion pills had been used by 2.4%.

In 2003 about half of the abortion patients had given birth at least once. More than one earlier induced abortion had been performed on 31% of the abortion patients and at least two earlier abortions on about 9% of the patients. The proportion of married abortion patients was 20%, while the proportion of unmarried was 72%. The percentage of divorced women and widows was 9%.

Tables

Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975–2003*

Table 2: Induced abortions by hospital district and age, 2003*

Table 3: Indications for induced abortions, 1970–2003*

Table 4: Induced abortions by indication, 2003*

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2003*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2003*

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2003*

Table 8: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989–2003*, %

Table 9: Methods for induced abortion, 1998–2003*

*) Preliminary data.

Sources

In Finland, the Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion, came into force on 1 July 1950, and statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortion was passed in 1970.

According to current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970, Decree on Induced Abortion 359/1970, Decree on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data are stored on the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES in accordance with the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (556/1989) and Section 6 of the relevant Decree (774/1989).

Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have been used as a source of information for earlier years. Since 1987, the register has been on the STAKES database. The data for 2003 are preliminary and based on the situation on 31 March 2004. The final examined data will be published in the autumn 2004.

With regard to the data by age group, it should be noted that from 1994 onwards age data in the register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years referred to the age at the end of the year. For this publication, the data for 1986–1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure.

Terms and definitions

Induced abortion: an artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the termination.

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2003*

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2003*

Table 1: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2003*

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntyneitä Levande födda Live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾ Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
			15-19 ²	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	225,8	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,5	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 360	119,7	17,1	18,4	10,9	9,2	9,1	6,2	1,4	10,7
1984	13 645	209,7	16,9	18,7	11,1	9,8	9,4	6,5	1,3	10,9
1985	13 833	220,3	16,5	19,5	11,8	9,9	9,3	6,6	1,3	11,0
1986	13 319	219,7	17,8	18,7	11,2	10,0	8,8	5,2	0,8	10,6
1987	12 986	217,4	17,9	18,3	11,7	9,3	8,2	5,5	0,8	10,3
1988	12 738	201,6	17,0	19,5	12,0	9,0	8,0	4,9	0,7	10,2
1989	12 647	199,8	17,2	18,5	12,8	9,4	7,8	4,9	0,7	10,1
1990	12 217	186,6	15,9	18,3	12,6	9,7	7,6	4,6	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,9	17,6	13,1	9,7	7,7	4,2	0,7	9,3
1992	11 064	165,9	12,9	16,5	12,7	9,8	7,2	3,7	0,6	8,7
1993	10 370	160,1	11,2	15,6	12,6	9,6	7,0	3,2	0,5	8,1
1994	10 011	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,3	3,2	0,5	7,9
1995	9 871	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 422	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 750	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 833	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 932	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 700	191,8	15,4	15,0	13,1	10,7	7,5	3,2	0,2	8,8
2002	10 908	196,3	16,1	16,4	12,4	10,7	7,6	3,3	0,2	9,1
2003*	10 643	187,8	14,8	16,7	12,0	10,8	8,0	2,8	0,3	9,0

1) Vuosina 1969-1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

År 1969-1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.

Years 1969-1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

*) Ennakkotieto.

Prelimär information.

Preliminary information.

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2003*

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2003*

Table 2. Abortions by hospital district and age 2003*

Sairaanhoitopiiri ⁽¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
	15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	16,9	19,3	13,7	11,9	9,3	3,2	0,3	10,3
Helsinki - Helsingfors	15,0	16,5	14,0	11,9	8,7	2,8	0,3	9,3
Uusimaa - Nyland	21,0	22,4	13,3	12,0	10,3	3,9	0,2	11,6
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	16,0	16,6	9,5	10,7	8,1	2,6	0,3	8,9
Satakunta - Satakunta	16,0	17,3	12,3	8,1	7,7	2,3	0,5	8,7
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	13,9	15,6	10,1	10,7	6,9	2,7	0,2	7,9
Pirkanmaa - Birkaland	14,7	15,6	10,5	9,6	9,2	2,9	0,2	8,7
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	13,3	18,0	17,2	13,3	7,1	2,5	0,3	9,5
Kymenlaakso - Kymmenedalen	15,2	18,3	11,7	11,6	5,9	3,8	0,0	8,7
Etelä-Karjala - Södra Karelen	10,1	12,5	14,6	6,8	7,0	1,8	0,0	7,0
Etelä-Savo - Södra Savolax	19,3	13,3	11,5	6,0	5,3	2,5	0,0	7,7
Itä-Savo - Östra Savolax	12,0	14,2	11,7	7,9	3,8	1,3	0,0	6,5
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	11,8	14,9	10,7	9,4	7,2	2,5	0,1	7,5
Pohjois-Savo - Norra Savolax	16,1	15,3	10,0	11,3	6,1	1,7	0,3	8,2
Keski-Suomi - Mellersta Finland	14,0	16,2	10,8	11,7	6,6	3,0	0,1	8,7
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	9,2	10,6	7,7	9,6	5,6	3,0	0,3	6,3
Vaasa - Vasa	14,1	16,8	10,5	8,9	8,0	2,6	0,4	8,6
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	10,5	12,1	8,4	6,9	8,3	3,9	0,0	7,1
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	14,5	13,2	10,4	10,4	5,8	2,3	0,4	8,1
Kainuu - Kajanaland	11,7	13,6	11,8	7,7	5,8	3,6	0,3	7,2
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	17,1	19,5	16,2	8,7	12,1	2,5	0,4	10,3
Lappi - Lappland	11,7	19,6	15,4	15,9	7,8	3,2	0,4	9,4
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland - Landskapet Åland	13,1	29,4	9,7	17,3	14,7	4,4	1,0	12,0
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	14,8	16,7	12,0	10,8	8,0	2,8	0,3	9,0

1) **Potilaan asuinkunnan mukaan.** Enligt hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

*) **Ennakkotieto.**

Prelimär information.

Preliminary information.

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2003*, %

Tabell 3: Indikationer för abort 1970-2003*, %

Table 3: Indications for induced abortion 1970-2003*, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Täyttänyt 40 v. Fyllt 40 år Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 ⁽¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 ⁽²⁾	20 622
1972 ⁽²⁾	22 146
1973 ⁽³⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ⁽³⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ⁽³⁾	6,0	74,8	-	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ⁽³⁾	5,4	76,2	-	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 360
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 645
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 833
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 319
1987	1,7	83,4	-	4,8	7,1	1,8	0,1	..	1,1	100	12 986
1988	1,3	84,4	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	..	0,1	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	..	0,1	100	12 647
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	..	0,1	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	..	0,1	100	11 737
1992	0,8	85,2	0,0	4,3	6,3	1,6	1,7	..	-	100	11 064
1993	0,6	85,5	0,0	4,2	6,1	1,9	1,6	..	0,0	100	10 370
1994	0,5	74,2	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	..	0,0	100	10 012
1995	0,5	77,5	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 871
1996	0,4	80,3	-	3,7	4,8	2,3	2,1	..	0,0	100	10 422
1997	0,3	80,8	0,0	4,4	4,5	2,0	1,9	..	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 750
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 833
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	-	100	10 932
2001	0,4	84,8	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	100	10 781 ⁽⁴⁾
2002	0,5	86,3	0,1	6,8	3,9	2,1	0,6	1,4	0,0	100	11 092 ⁽⁴⁾
2003*	0,5	87,5	0,1	6,9	3,7	2,0	1,0	1,3	0,0	100	10 845 ⁽⁴⁾

1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. Under the current law.

2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. Statistiken över total antalet. Statistics on available total number only.

3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. Based on a sample.

4) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

*) Ennakkotieto.

Prelimär information.

Preliminary information.

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2003*

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2003*

Table 4: Abortions by indication 2003*

Siviilisääty, ikä ja synnytysten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar Marital status, age and number of deliveries	Peruste - Indikation - Indication								Yhteensä ⁽¹⁾ Totalt Total
	Lääkietiet. Medicinsk Medical	Sosiaalinen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Yli 40 vuotta Över 40 år Age 40 or more	4 lasta 4 barn 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	
Naimisissa - Gift - Married	18	1 722	0	4	191	129	57	86	2 207
Naimaton - Ogift - Single	32	6 679	5	711	99	34	44	48	7 652
Leski - Änka - Widowed	0	32	1	0	1	0	0	0	34
Eronnut - Frånskild - Divorced	1	802	2	0	92	46	2	4	949
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Yhteensä - Totalt - Total	51	9 238	8	715	383	209	103	138	10 845
Ikä - Ålder - Age ⁽²⁾									
-13	0	0	0	13	0	0	0	0	13
14	0	0	1	47	0	0	0	0	48
15	0	1	0	194	0	0	1	0	196
16	0	3	0	379	0	0	0	0	382
17	0	412	0	82	0	0	0	1	495
18	1	594	0	0	0	0	2	2	599
19	3	663	0	0	0	0	1	0	667
20-24	7	2 662	3	0	0	4	8	20	2 704
25-29	11	1 834	1	0	0	27	20	36	1 929
30-34	12	1 537	2	0	0	53	24	27	1 655
35-39	13	1 302	1	0	0	90	26	35	1 467
40-44	1	214	0	0	348	33	18	17	631
45-49	3	16	0	0	35	2	3	0	59
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	51	9 238	8	715	383	209	103	138	10 845
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries									
0	18	4 774	4	708	47	0	42	63	5 656
1	11	1 755	1	7	73	0	37	36	1 920
2	17	1 734	3	0	137	1	14	27	1 933
3	4	776	0	0	85	7	6	7	885
4	1	141	0	0	31	141	3	2	319
5	0	45	0	0	7	43	1	0	96
6	0	7	0	0	1	8	0	1	17
7	0	5	0	0	2	6	0	0	13
8	0	1	0	-	0	3	0	0	4
9-	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	51	9 238	8	715	383	209	103	138	10 845

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. *Age on the day of operation.*

***) Ennakkotieto.**

Prelimär information.

Preliminary information.

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2003*

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2003*

Table 5: Induced abortions by gestation length 1985-2003*

	Viikkoja - Veckor - Weeks							Yhteensä Totalt Total
	-7	8	9	10	11	12- Tuntematon Okänd Unknown		
	1985	4450	3 086	2 647	1 987	949	713	
1986	4542	2 982	2 459	1 784	869	683	0	13 319
1987	4130	2 951	2 486	1 765	962	679	13	12 986
1988	4170	2 722	2367	1828	982	667	2	12 738
1989	4138	2 693	2 448	1 799	858	707	4	12 647
1990	4074	2 693	2 285	1 680	812	671	2	12 217
1991	4266	2 565	2 126	1 466	669	645	0	11 737
1992	4127	2 374	1 987	1 340	627	609	0	11 064
1993	3992	2 306	1 808	1 158	550	556	-	10 370
1994	4095	2 140	1 614	1 096	461	605	0	10 011
1995	4017	2 089	1 661	1 079	436	589	0	9 871
1996	4198	2 273	1 641	1 102	600	604	4	10 422
1997	4307	2 253	1 556	1 087	465	581	1	10 250
1998	4702	2 293	1 596	1 074	459	623	3	10 750
1999	4766	2 318	1 550	1 098	456	644	1	10 833
2000	4977	2 233	1 583	1 036	431	672	-	10 932
2001	5843	1 726	1 213	916	356	646	0	10 700
2002	6 168	1 696	1 096	876	382	684	0	10 902
2003*	6 265	1 617	955	780	377	649	0	10 643
%								
1985	32,2	22,3	19,1	14,4	6,9	5,2	0,0	100
1986	34,1	22,4	18,5	13,4	6,5	5,1	0,0	100
1987	31,8	22,7	19,1	13,6	7,4	5,2	0,1	100
1988	32,7	21,4	18,6	14,4	7,7	5,2	0,0	100
1989	32,7	21,3	19,4	14,2	6,8	5,6	0,0	100
1990	33,3	22,0	18,7	13,8	6,6	5,5	0,0	100
1991	36,3	21,9	18,1	12,5	5,7	5,5	0,0	100
1992	37,3	21,5	18,0	12,1	5,7	5,5	0,0	100
1993	38,5	22,2	17,4	11,2	5,3	5,4	-	100
1994	40,9	21,4	16,1	10,9	4,6	6,0	0,0	100
1995	40,7	21,2	16,8	10,9	4,4	6,0	0,0	100
1996	40,3	21,8	15,7	10,6	5,8	5,8	0,0	100
1997	42,0	22,0	15,2	10,6	4,5	5,7	0,0	113
1998	43,7	21,3	14,8	10,0	4,3	5,8	0,0	102
1999	44,0	21,4	14,3	10,1	4,2	5,9	0,0	104
2000	45,5	20,4	14,5	9,5	3,9	6,1	-	102
2001	54,6	16,1	11,3	8,6	3,3	6,0	0,0	100
2002	56,6	15,6	10,1	8,0	3,5	6,3	0,0	100
2003*	58,9	15,2	9,0	7,3	3,5	6,1	0,0	100

***) Ennakkotieto.**

Prelimär information.

Preliminary information.

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2003*

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2003*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries 1987-2003*

Aikaisemmat synnytykset								
Tidigare förlossningar								
<i>Previous deliveries</i>								
	0	1	2	3	4	5- Tuntematon	Yhteensä	
						Okänd	Totalt	
						<i>Unknown</i>	<i>Total</i>	
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2165	2552	1105	283	51	38	12 738
1989	6 419	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 647
1990	6 149	2 111	2 480	1 097	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 329	2 133	2 254	991	262	77	18	11 064
1993	4 829	2 030	2 249	904	248	90	20	10 370
1994	4 594	1 957	2 171	945	239	94	11	10 011
1995	4 689	1 908	2 054	900	229	90	1	9 871
1996	4 876	1 986	2 195	998	287	78	2	10 422
1997	4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
1998	5 243	1 991	2 146	1 011	274	85	-	10 750
1999	5 431	1 950	2 132	983	245	92	-	10 833
2000	5 673	1 901	2 064	938	271	85	-	10 932
2001	5 475	1 955	2 005	908	249	107	1	10 700
2002	5 707	1 937	2 014	881	269	94	-	10 902
2003*	5 616	1 898	1 901	871	255	102	-	10 643
%								
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,3	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989	50,7	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,2	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,1	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,7	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
1999	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100
2003*	52,8	17,8	17,9	8,2	2,4	1,0	-	100

*) **Ennakkotieto.**

Prelimär information.

Preliminary information.

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2003*

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2003*

Table 7: Induced abortions by previous abortions 1987-2003*

	Aikaisemmat keskeytykset					5- Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total	
	Tidigare aborter Previous abortions							
	0	1	2	3	4			
1987	9 454	2 528	537	144	33	13	277	12 986
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
1989	9 153	2 526	547	124	28	20	249	12 647
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
1992	7 697	2 454	620	147	45	23	78	11 064
1993	7 183	2 299	590	148	40	17	93	10 370
1994	6 929	2 132	602	142	44	28	134	10 011
1995	6 912	2 153	578	154	47	24	3	9 871
1996	7 247	2 273	663	174	35	28	2	10 422
1997	7 172	2 185	626	182	44	27	14	10 250
1998	7 579	2 263	641	182	58	27	-	10 750
1999	7 774	2 182	624	171	52	29	1	10 833
2000	7 772	2 256	648	172	55	29	-	10 932
2001	7 571	2 243	616	187	48	33	2	10 700
2002	7 665	2 251	683	217	47	37	2	10 902
2003*	7 272	2 354	694	194	85	44	-	10 643
	%							
1987	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,1	1,8	100
1988	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,2	2,0	100
1989	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,2	0,7	100
1990	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,2	1,0	100
1991	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,2	0,7	100
1992	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,2	0,9	100
1993	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,2	0,1	100
1998	70,5	21,1	6,0	1,7	0,5	0,1	-	100
1999	71,8	20,1	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100
2000	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100
2001	70,8	21,0	5,8	1,7	0,4	0,2	0,0	100
2002	70,3	20,6	6,3	2,0	0,4	0,2	0,0	100
2003*	68,3	22,1	6,5	1,8	0,8	0,4	-	100

*) Ennakkotieto.

Prelimär information.

Preliminary information.

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2003*, %

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter 1980, 1985, 1989-2003*, %

Table 8: Contraceptives used by abortion patients 1980, 1985, 1989-2003*, %

	Pilleri ¹⁾	Kohdunsisäinen hormoniehkäisin	Kierukka	Kondomi	Sterilointi	Muu	Ei mitään	Tunte- maton	Jälkiehkäisy ²⁾	Yhteensä ³⁾
	P-piller Pill	Hormonspiral Hormone releasing IUD	Spiral IUD	Kondom Condom	Sterilisering Sterilisation	Annat Other	Ingenting Nothing	Okänd Unknown	Akut p-piller Post-coital oral contraceptive	Totalt Total
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	..	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	34,1	4,1	..	101,2
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	33,7	4,5	..	100,7
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	34,8	4,7	..	101,0
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	32,6	4,6	..	100,6
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	32,0	5,4	..	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	8,6	..	105,7
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	8,9	..	106,0
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	8,6	..	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	8,9	..	100,0
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	7,4	1,0	105,6
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	6,8	1,3	105,9
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	7,1	0,9	105,7
2001	8,6	0,1	1,4	50,0	0,4	1,7	35,7	5,0	1,2	104,1
2002	9,1	0,2	1,3	49,9	0,4	1,8	35,7	6,9	1,5	106,8
2003*	10,1	0,3	1,1	49,3	0,2	2,5	36,3	8,7	2,4	110,9

1) **Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli.** Från år 1998 p-piller eller kapsel. *From 1998 the pill or capsule.*

2) **Ei muuta mainittu.** Inga andra nämnts. *No mention of other contraceptive.*

3) **Useampi menetelmä mahdollinen.** Mera än en medel möjlig. *More than one method possible.*

***) Ennakkotieto.**

Prelimär information.

Preliminary information.

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 1998-2003*

Tabell 9: Abortmetoder 1998-2003*

Table 9: Methods for induced abortion 1998-2003*

	Laajennus, imukaavinta	Laajennus, tyhjennys, imukaavinta	Varhaisimu Tidig utrymning med sug	Abortiivaine Abortiv- medel	Prostaglandiini tai muu lääke Prostaglandin eller annat läkemedel	Mifegyne Mifegyne	Keisarileikkaus Kejsarsnitt	Muu Annat	Tuntematon Okänd	Yhteensä Totalt
	Dilation, suction curretage	Dilation, evacuation, suction curretage	Early suction	Abortion agent	Prostaglandin or other drug	Mifegyne	Caesarean section	Other	Unknown	Total
Yhteensä - Totalt - Total										
1998	9 436	366	403	288	230	-	5	22	-	10 750
1999	9 374	396	425	422	178	-	4	33	1	10 833
2000	9 228	338	191	481	348	333	3	10	-	10 932
2001	7 192	229	159	491	838	1 758	5	28	-	10 700
2002	5 996	134	142	557	1096	2 966	3	8	-	10 902
2003*	4 980	107	103	604	1330	3 512	2	5	-	10 643
%										
1998	87,8	3,4	3,7	2,7	2,1	-	0,0	0,2	-	100
1999	86,5	3,7	3,9	3,9	1,6	-	0,0	0,3	0,0	100
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	3,2	3,0	0,0	0,1	-	100
2001	67,2	2,1	1,5	4,6	7,8	16,4	0,0	0,3	-	100
2002	55,0	1,2	1,3	5,1	10,1	27,2	0,0	0,1	-	100
2003*	46,8	1,0	1,0	5,7	12,5	33,0	0,0	0,0	-	100
Ennen 13. viikkoa / Före 13:e vecka / Before 13th week										
1998	9 288	281	400	5	140	-	-	10	-	10 124
1999	9 282	328	423	7	130	-	-	18	-	10 188
2000	9 139	284	191	14	295	333	-	4	-	10 260
2001	7 117	195	159	22	797	1 756	-	8	-	10 054
2002	5 944	109	142	14	1 040	2 966	-	3	-	10 218
2003*	4 947	86	103	15	1 329	3 512	-	2	-	9 994
%										
1998	91,7	2,8	4,0	0,0	1,4	-	-	0,1	-	100
1999	91,1	3,2	4,2	0,1	1,3	-	-	0,2	-	100
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,9	3,2	-	0,0	-	100
2001	70,8	1,9	1,6	0,2	7,9	17,5	-	0,1	-	100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	10,2	29,0	-	0,0	-	100
2003*	49,5	0,9	1,0	0,2	13,3	35,1	-	0,0	-	100
13. viikolla tai sen jälkeen / 13. vecka eller därefter / 13th week of thereafter										
1998	146	85	2	283	90	-	5	12	-	623
1999	91	68	2	415	48	-	4	15	1	644
2000	89	54		467	53	-	3	6	-	672
2001	75	34	0	469	41	2	5	20	-	646
2002	52	25	0	543	56	-	3	5	-	684
2003*	33	21	0	589	1	-	2	3	-	649
%										
1998	23,4	13,6	0,3	45,4	14,4	-	0,8	1,9	-	100
1999	14,1	10,6	0,3	64,4	7,5	-	0,6	2,3	0,2	100
2000	13,2	8,0	0,0	69,5	7,9	-	0,4	0,9	-	100
2001	11,6	5,3	0,0	72,6	6,3	0,3	0,8	3,1	-	100
2002	7,6	3,7	0,0	79,4	8,2	-	0,4	0,7	0,0	100
2003*	5,1	3,2	0,0	90,8	0,2	-	0,3	0,5	-	100

***) Ennakkotieto.**

Prelimär information.

Preliminary information.