

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2006

26.11.2007

Aborter och steriliseringar 2006

Induced abortions and sterilisations 2006

Raskaudenkeskeytykset

Tiina Sevón
+358 9 3967 2306

Anne Soimula
+358 9 3967 2359

Mika Gissler
+358 9 3967 2279


sähköposti:
etunimi.sukunimi@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2459

S S

Vuonna 2006 tehtiin 10 645 raskaudenkeskeytystä eli 9,1 tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49 -vuotiasta) naista kohti. Keskeytysten määrä laski kolme prosenttia eli hieman yli 300 keskeytyksellä edellisestä vuodesta. Keskeytysten määrä väheni kaikissa ikäryhmissä. Eniten keskeytykset vähenivät alle 20-vuotiailla, yhteensä 4,6 prosenttia.

Kuvio 1: Alle 30-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä kohti 2000–2006



Vuoden 2006 keskeytyksistä 88,7 prosenttia oli tehty sosiaalisin perustein eli elämänoloista ja muista olosuhteista aiheutuvan huomattavan rasituksen vuoksi. Muut yleisimmät perusteet olivat alle 17 vuoden ikä (6,1 %), yli 40 vuoden ikä (3,8 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,1 %). Lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinviaasta tai heikkoudesta naisen hen-

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

gelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi suoritettiin 0,4 prosenttia keskeytyksistä. Mahdollisen tai todetun sikiövaurion vuoksi suoritettuja keskeytyksiä oli 2,8 prosenttia kaikista keskeytyksistä.

Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna vuonna 2006 eniten keskeytyksiä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohti tehtiin Länsi-Pohjan (12,2) ja Lapin (10,7) sairaanhoitopiirissä. Alhaisimmat keskeytysluvut olivat Keski-Pohjanmaan (5,7) ja Etelä-Savon (6,6) sairaanhoitopiireissä.

Ennen 6. raskausviikkoa tehtyjen keskeytysten osuus oli 37,9 prosenttia vuonna 2006. Suurin osa keskeytyksistä (92,8 %) tehtiin ennen 12. raskausviikkoa. Lääkkeellisten keskeytysten osuus kaikista keskeytyksistä lisääntyi ollen 57,5 prosenttia. Raskaudenkeskeyttäneistä noin joka kolmannella (33,2 %) oli vähintään yksi aikaisempi keskeytys ja lähes puolella (47,6 %) vähintään yksi aikaisempi synnytys.


Raskauden alkaessa 61,7 prosenttia oli käyttänyt jotain ehkäisymenetelmää ja 2,7 prosenttia oli käyttänyt jälkiehkäisyä. E-pilleri oli yleisin suunniteltu ehkäisymenetelmä keskeytyksen jälkeen. Keskeytyksen jälkeen mitään ehkäisyä ei oltu suunniteltu tai suunnitellusta ehkäisystä ei ollut tietoa 8,4 prosentilla.

Steriloinnit

Steriloitien kokonaismäärä väheni edelleen 24 prosentilla vuonna 2006. Naisten sterilointeja tehtiin noin 3 800 ja miesten sterilointeja vajaat 1 500. Naisten steriloinnit vähenivät noin 25 prosenttia ja miesten noin 19 prosenttia. Steriloinneista 72 prosenttia tehtiin naisille ja 28 prosenttia miehille vuonna 2006.

Yleisin steriloinnin peruste oli vähintään 30 vuoden ikä sekä miehillä (78 %) että naisilla (62 %). Väestöön suhteutettuna tehtiin 2,5 sterilointia tuhatta 25–54 -vuotiasta kohti, naisille enemmän (3,6) kuin miehille (1,4). 5-vuotisikäryhmittäin tarkasteltuna suurin osa naisten (39,9 %) ja miesten (30,2 %) steriloinneista tehtiin 35–39 -vuotiaille.

Kuvio 2: Steriloinnit tuhatta 25–54 -vuotiasta kohti, 1950–2006



Väkilukuun suhteutettuna eniten sterilointeja tehtiin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (4,1/1 000 25–54 -vuotiasta) sekä vähiten Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (1,6/1 000) ja Helsingissä (1,1/1000). Miesten sterilointeja tehtiin eniten Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä (3,0/1 000) sekä vähiten Ahvenanmaalla (0,0/1 000). Naisten sterilointeja tehtiin eniten Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (7,0/1 000) sekä vähiten Keski-Suomessa (1,9/1 000) ja Helsingissä (1,5/1 000).

Taulukot:

Taulukko 1a: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin 1969–1970, 1975–2006

Taulukko 1b: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin 1969–1970, 1975–2006

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2006

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970, 1973–2006

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2006

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985–2006

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2006

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2006

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989–2006

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2006

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000–2006

Taulukko 11: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951–2006

Taulukko 12: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2006

Taulukko 13: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994–2006

Taulukko 14: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994–2006

Taulukko 15: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2006

Taulukko 16: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2006

Taulukko 17: Raskaudenkeskeytys- ja steriloimisrekisterin aikasarjoja, keskeytykset 1975, 1980, 1985, 1990, 1995–2006

Taulukko 18: Raskaudenkeskeytys- ja steriloimisrekisterin aikasarjoja, steriloinnit 1975, 1980, 1985, 1990, 1995–2006

Tietolähteet:

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja keskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisestä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970.

Toimenpiteitä koskevien lakien (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970 ja Steriloimislaki 283/1970) sekä niiden nojalla annettujen asetusten (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Steriloimisasetus 427/1985) mu-

kaisesti suorittajalääkärin on toimitettava Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja sterilointirekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveyden-huollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella.

Varhaisempien vuosien tilastot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä Lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintölaitos vuosina 1935–1954, Yleinen terveyden- ja sairaanhoito vuosina 1955–1970, Terveydenhuolto vuosina 1971–1987). Vuodesta 1987 lähtien rekisterin tiedot ovat Stakesin tietokannassa. Vuosien 1987–2004 aineistoa on tarkastettu, mm. kaksoiskappaleita poistettu ja aiemmin tilastoihin mukaan ottamattomia myöhemmin ilmoitettuja tapauksia on tallennettu. Tämän vuoksi osa tiedoista poikkeaa aiemmin julkaistuista tilastoista.

Ikäryhmittäisessä tarkastelussa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, mutta ennen vuotta 1994 ikä vuoden lopussa. Tähän julkaisuun on takautuvasti laskettu vuosien 1986–1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä.

Käsitteet ja määritelmät:

Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

Steriloimisella tarkoitetaan miehen tai naisen sukuelimiin kohdistuvaa toimenpidettä, joka johtaa pysyvään suvunjakamiskyvyttömyyteen. Steriloinneiksi ei katsota sellaisia sukuelimiä koskevia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ruumiillisen sairauden hoitamiseksi.

Aborter och steriliseringar 2006

26.11.2007

Aborter

Tiina Sevón
+358 9 3967 2306

Anne Soimula
+358 9 3967 2359


Mika Gissler
+358 9 3967 2279

sähköposti:
fornamn.efternamn@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2459

År 2006 utfördes 10 645 aborter, dvs. 9,1 per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–49 år). Totala antalet aborter minskade med 3 procent, dvs. med drygt 300 aborter från året innan. Antalet aborter minskade i alla åldersgrupper. Mest minskade antalet aborter bland kvinnor under 20 år, totalt 4,6 procent.

Diagram 1: Aborter i åldrarna under 30 år efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma ålder 2000–2006



Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

År 2006 utfördes 88,7 procent av aborterna på social indikation, dvs. på grund av betydande belastning för kvinnan med hänsyn till levnadsförhållanden och andra omständigheter. De övriga mest frekventa indikationerna var ålder under 17 år (6,1 procent), över 40 år (3,8 procent) och fyra tidigare förlossningar (2,1 procent). På medicinsk indikation, dvs. till följd av sjukdom, kroppsslyte eller svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa, utfördes 0,4 procent av aborterna. Av alla aborter verkställdes 2,8 procent på grund av möjlig eller konstaterad fosterskada.

År 2006 utfördes mest aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt (12,2) och i Lapplands sjukvårdsdistrikt (10,7). Antalet aborter var minst i Mellersta Österbotten (5,7) och Södra Savolax (6,6).

Andelen aborter före den sjätte graviditetsveckan var 37,9 procent år 2006. Största delen av aborterna (92,8 procent) gjordes före den tolfte graviditetsveckan. Andelen farmakologiska aborter av alla aborter ökade till 57,5 procent. Av abortpatienterna hade cirka var tredje (33,2 procent) genomgått minst ett tidigare abortingrepp och nästan hälften (47,6 procent) hade fött minst ett barn.


Av abortpatienterna uppgav 61,7 procent att de använt någon typ av preventivmedel när graviditeten uppstod och 2,7 procent att de använt akut p-piller. P-piller var den vanligaste planerade preventivmetoden efter ett abortingrepp. Efter aborten hade 8,4 procent av abortpatienterna ingen planerad preventivmetod eller inga kunskaper om någon sådan.

Steriliseringar

Antalet steriliseringar fortsatte minska 2006, totalt 24 procent. Totalt steriliserades cirka 3 800 kvinnor och drygt 1 500 män. Sterilisering av kvinnor minskade med cirka 25 procent och ungefär 19 procent bland män. Av steriliseringarna var 72 procent sterilisering av kvinnor och 28 procent av män år 2006.

Den vanligaste steriliseringsindikationen var både för män (78 procent) och kvinnor (62 procent) minst 30 års ålder. I relation till befolkningen utfördes 2,5 steriliseringar per 1 000 personer i åldern 25–54 år oftare bland kvinnor (3,6) än män (1,4). Största delen av sterilisering av kvinnor (39,9 procent) och av män (30,2 procent) görs i åldersgruppen 35–39 år.

Diagram 2: Steriliseringar per 1 000 personer i åldern 25-54 år, 1950–2006



I relation till folkmängden gjordes flest steriliseringar i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (4,1/1 000 personer i åldern 25–54 år) och minst i Mellersta Finland (1,6/1 000) samt i Helsingfors (1,1/1000). Mest steriliserades män i Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt (3,0/1 000) och minst på Åland (0,0/1 000). Kvinnor steriliserades mest i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (7,0/1 000) och minst i Mellersta Finland (1,9/1 000) och i Helsingfors (1,5/1 000).

Tabeller:

- Tabell 1a: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2006
- Tabell 1b: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2006
- Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2006
- Tabell 3: Indikationer för abort 1970, 1973-2006
- Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2006
- Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2006
- Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2006
- Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2006
- Tabell 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989-2006
- Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983-2006
- Tabell 10: Abortmetoder 2000-2006
- Tabell 11: Steriliseringar efter kön 1951-2006
- Tabell 12: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2006
- Tabell 13: Sterilisering av kvinnor efter åldersgrupp 1994-2006
- Tabell 14: Sterilisering av män efter åldersgrupp 1994-2006
- Tabell 15: Sterilisering av kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2006
- Tabell 16: Sterilisering av män efter indikation, civilstånd och ålder 2006
- Tabell 17: Registret över aborter och steriliseringar, tidsserier för aborter 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006
- Tabell 18: Registret över aborter och steriliseringar, tidsserier för steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006

Källor:

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970.

Enligt lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) och steriliseringslagen (283/1970) samt de förordningar som utfärdats med stöd av dessa (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar, som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och 6 § i den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.

Statistik från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en del av den officiella statistiken (Lääkintölaivos [Medicinalverket] 1935-1954), Yleinen terveyden- ja sairaanhoito [Allmän hälso- och sjukvård] 1955-1970), Terveydenhuolto [Hälso- och sjukvård] 1971-1987. Från 1987 har registeruppgifterna funnits i Stakes databas. Uppgifterna från 1987-2004 har granskats, bl.a. genom att avlägsna dubbla registreringar och inkludera fall som inte förut har ingått i statistiken eftersom de har anmälts senare. Därför avviker en del av uppgifterna från den statistik som publicerats tidigare.

När man granskar uppgifter efter åldersgrupp, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I denna publikation har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på ingreppsdagen

Begrepp och definitioner:

Abort (avbrytande av graviditet): En graviditet som har avbrutits artificiellt och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte har dött intrauterint före ingreppet.

Sterilisering: Ett ingrepp i en mans eller en kvinnas könsorgan, som medför bestående avsaknad av fortplantningsförmåga. Sådana ingrepp i könsorganen som är nödvändiga i behandlingen av somatiska sjukdomar betraktas inte som steriliseringar.


Induced Abortions and Sterilisations 2006

26.11.2007

Induced abortions

In 2006, induced abortions totalled 10 645, which is 9.1 abortions per thousand women of childbearing age (15–49 years). This represents a decrease of 3 per cent or just over 300 abortions compared with the previous year. The number of abortions decreased in all age groups. The greatest decrease, 4.6 per cent, was observed in the under-20 age group.

Figure 1: Induced abortions among under-30s by age, per thousand women of the same age, 2000-2006



In 2006, 88.7 per cent of abortions were performed on social grounds, that is, the birth of the child would have caused considerable strain to the mother in view of her personal circumstances and living conditions. The other most common indications were the mother being under 17 (6.1 per cent), over 40 (3.8 per cent), or having given birth to four children (2.1 per cent). Of the abortions, 0.4 per cent were performed on medical grounds, that is, the pregnancy would have endangered the woman's life or health because of illness, a physical disability or

Tiina Sevón
+358 9 3967 2306

Anne Soimula
+358 9 3967 2359

Mika Gissler
+358 9 3967 2279

sähköposti:
firstname.lastname@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2459

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

debility. Abortions performed because of a potential or detected foetal defect accounted for 2.8 per cent of all abortions.

An analysis by hospital district shows that in 2006 the greatest number of abortions per thousand women of childbearing age were performed in the hospital districts of Länsi-Pohja (12.2) and Lapland (10.7). The lowest figures were found in Central Ostrobothnia (5.7) and Etelä-Savo (6.6).

The proportion of abortions before the 6th week of gestation was 37.9 per cent in 2006. Most abortions were performed before the 12th week of gestation (92.8 per cent). The proportion of abortions induced by drugs increased, being 57.5 per cent of all induced abortions. Approximately one in every three patients (33.2 per cent) had undergone at least one previous induced abortion, and nearly one half (47.6 per cent) at least one previous delivery.


When the pregnancy started, 61.7 per cent had used some contraceptive method. Post-coital oral contraceptive had been used by 2.7 per cent, representing a slight increase on the previous year. The most common planned contraceptive method after abortion was the pill. In 8.4 per cent of the cases, no contraceptive method had been planned after abortion or no data were available.

Sterilisations

The total number of sterilisations continued to decrease in 2006, in total 24 per cent. Female sterilisations totalled some 3 800 and male sterilisations just under 1 500. Female sterilisations decreased some 25 per cent and male sterilisations some 19 per cent. In 2006, female sterilisations accounted for 72 per cent and male sterilisations for 28 per cent.

The age of 30 and over was the most common indication for both male (78 per cent) and female (62 per cent) sterilisations. In proportion to the population, 2.5 sterilisations were performed per thousand persons aged 25–54. Women showed a higher rate (3.6) than men (1.4). The 35–39 age group accounted for a majority of both female (39.9 per cent) and male (30.2 per cent) sterilisations.

Figure 2: Sterilisations per 1 000 persons aged 25-54 years, 1950–2006



In proportion to the total population, the highest sterilisation rate was found in the hospital district of Keski-Pohjanmaa (4.1 per 1 000 persons aged 25-54 years) and the lowest in Keski-Suomi (1.6 per 1 000) and in Helsinki (1.1 per 1000). The highest rate of male sterilisations was found in the hospital district of Kanta-Häme (3.0 per 1 000) and the lowest in Ahvenanmaa (0.0 per 1 000). The highest

rate of female sterilisation was found in the hospital district of Keski-Pohjanmaa (7.0 per 1 000) and the lowest in Central Finland (1.9 per 1 000) and in Helsinki (1.5 per 1 000).

Tables:

Table 1a: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2006

Table 1b: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2006

Table 2: Abortions by hospital district and age 2006

Table 3: Indications for induced abortion 1970, 1973-2006

Table 4: Abortions by indication 2006

Table 5: Induced abortions by gestation length 1985-2006

Table 6: Induced abortions by previous deliveries 1987-2006

Table 7: Induced abortions by previous abortions 1987-2006

Table 8: Contraceptives used by abortion patients 1980, 1985, 1989-2006

Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after abortion 1983-2006

Table 10: Methods for induced abortion 2000-2006

Table 11: Sterilisations by sex 1951-2006

Table 12: Sterilisations by hospital district 2006

Table 13: Female sterilisations by age 1994-2006

Table 14: Male sterilisations by age 1994-2006

Table 15: Female sterilisations by indication, marital status, age and previous deliveries 2006

Table 16: Male sterilisations by indication, marital status and age 2006

Table 17: Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, induced abortions 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006

Table 18: Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, sterilisations 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006

Sources:

The Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion in Finland, came into force on 1 July 1950, and statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortion is from 1970.

In accordance with current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970, Decree on Induced Abortion 359/1970 and Act on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data are stored in the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES in accordance with the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (556/1989) and Section 6 of the relevant Decree (774/1989).

Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have been used as a source of information for earlier years. Since 1987, the register has been on the STAKES database. Data for 1987-2004 have been checked for instance by removing data that had been entered twice and by adding cases that had arrived later and had not previously been included. For

these reasons, some of the data are at variance with previously published statistics.

With regard to the data by age group, it should be noted that from 1994 onwards age data in the register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years referred to the age at the end of the year. For this publication, the data for 1986–1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure.

Concepts and definitions

Induced abortion/termination of pregnancy: an artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the termination.

Sterilisation refers to an operation on the male or female genitals resulting in permanent inability to produce offspring. Operations performed on the genitals in cases where the operation is regarded as necessary in the treatment of a somatic disease are not regarded as sterilisations.

Taulukko 1a: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2006

Tabell 1a: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2006

Table 1a: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2006

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntyneitä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾ Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma ålder By age group per 1000 women of the same age							
			15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	225,8	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,5	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 323	199,7	21,2	16,4	10,3	9,3	8,3	5,4	0,8	10,7
1984	13 640	209,7	20,9	17,1	10,9	9,7	8,8	5,4	0,8	10,9
1985	13 787	220,3	20,7	17,6	11,3	9,8	9,1	5,1	0,8	11,0
1986	13 316	219,7	19,5	18,3	11,0	10,0	8,6	4,8	0,6	10,6
1987	12 986	217,4	17,5	18,4	11,8	9,3	8,1	5,7	0,9	10,3
1988	12 738	201,6	16,7	19,4	12,1	9,1	7,9	5,1	0,8	10,1
1989	12 646	199,7	16,7	18,7	12,9	9,4	7,8	5,0	0,8	10,1
1990	12 217	186,6	15,6	18,3	12,5	9,8	7,4	4,7	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,5	17,5	13,1	9,7	7,6	4,4	0,8	9,3
1992	11 069	166,0	12,4	16,5	12,8	9,8	7,2	3,9	0,7	8,7
1993	10 375	160,2	10,9	15,5	12,8	9,7	6,9	3,4	0,5	8,2
1994	10 013	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,4	3,2	0,5	7,9
1995	9 872	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 423	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 751	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 837	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 932	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 738	192,5	15,4	15,0	13,2	10,8	7,6	3,3	0,2	8,9
2002	10 974	198,3	16,3	16,6	12,6	10,7	7,7	3,3	0,2	9,1
2003	10 767	190,7	15,3	17,0	12,3	10,7	8,0	2,9	0,3	9,0
2004	11 162	193,9	15,7	18,5	12,7	10,7	7,9	3,2	0,2	9,4
2005	10 969	190,3	15,0	18,2	12,8	10,4	7,9	3,4	0,2	9,3
2006	10 645	180,8	14,1	18,1	12,3	9,9	7,9	3,3	0,2	9,1

1) Vuosina 1969-1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

År 1969-1985: ålder = ingreppsår minus födelseår, från år 1986 ålder på ingreppsdagen.

Years 1969-1985: age = year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19.

Taulukko 1b: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2006

Tabell 1b: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2006

Table 1b: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2006

Vuosi År Year	Ikäryhmä Åldersgrupp Age group							Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
	-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-		
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	8 175
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	14 757
1975	4 143	5 324	4 803	2 766	2 461	1 800	250	-	21 547
1976	3 919	5 068	3 775	2 737	2 400	1 582	337	-	19 818
1977	3 704	4 382	3 408	2 624	2 009	1 383	261	1	17 772
1978	3 731	4 158	3 172	2 551	1 732	1 352	230	2	16 928
1979	3 670	3 850	2 741	2 524	1 548	1 281	235	-	15 849
1980	3 618	3 681	2 410	2 351	1 593	1 161	223	-	15 037
1981	3 321	3 388	2 254	2 177	1 642	1 146	192	-	14 120
1982	3 305	3 428	2 152	2 062	1 703	1 032	179	-	13 861
1983	3 860	3 029	1 985	1 910	1 617	794	104	24	13 323
1984	3 715	3 163	2 060	1 953	1 826	806	108	9	13 640
1985	3 562	3 263	2 118	1 946	1 958	787	119	34	13 787
1986	3 236	3 359	2 030	1 978	1 838	785	83	7	13 316
1987	2 782	3 356	2 162	1 831	1 705	1 017	131	2	12 986
1988	2 544	3 488	2 220	1 749	1 633	990	113	1	12 738
1989	2 466	3 284	2 381	1 783	1 580	1 035	115	2	12 646
1990	2 299	3 128	2 311	1 837	1 481	1 011	144	6	12 217
1991	2 016	2 909	2 415	1 814	1 508	935	135	5	11 737
1992	1 898	2 638	2 349	1 823	1 422	810	122	7	11 069
1993	1 709	2 375	2 326	1 810	1 347	703	105	-	10 375
1994	1 710	2 160	2 306	1 863	1 218	655	99	2	10 013
1995	1 766	2 163	2 230	1 784	1 246	598	84	1	9 872
1996	1 818	2 263	2 308	2 036	1 337	583	78	-	10 423
1997	1 913	2 241	2 140	2 000	1 319	566	71	-	10 250
1998	2 094	2 379	2 086	2 122	1 440	580	50	-	10 751
1999	2 282	2 507	2 047	1 933	1 448	562	58	-	10 837
2000	2 406	2 557	1 945	1 933	1 468	574	49	-	10 932
2001	2 489	2 403	1 989	1 798	1 402	610	47	-	10 738
2002	2 592	2 645	1 936	1 728	1 416	614	41	2	10 974
2003	2 407	2 729	1 939	1 646	1 456	540	50	-	10 767
2004	2 456	3 001	2 038	1 609	1 418	594	46	-	11 162
2005	2 335	2 968	2 067	1 557	1 372	626	44	-	10 969
2006	2 228	2 947	1 985	1 511	1 322	610	42	-	10 645

1) Vuosina 1969-1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

År 1969-1985: ålder = ingreppsår minus födelseår, från år 1986 ålder på ingreppsdagen.

Years 1969-1985: age = year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2006

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2006

Table 2. Abortions by hospital district and age 2006

Sairaanhoitopiiri ⁽¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma ålder By age group per 1000 women of the same age							
	15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	16,3	20,7	13,1	11,1	9,0	4,1	0,3	10,3
- Uusimaa - Nyland	15,3	21,6	13,8	10,3	8,2	3,9	0,3	9,7
- Helsinki - Helsingfors	18,3	19,7	12,5	12,3	10,4	4,4	0,4	11,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	13,4	17,3	11,5	9,3	6,7	3,5	0,4	8,7
Satakunta - Satakunta	13,4	18,7	10,6	9,0	6,9	2,9	0,1	8,3
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	15,0	16,3	13,0	9,1	7,1	1,9	-	8,2
Pirkanmaa - Birkaland	15,6	16,1	10,7	9,1	8,3	3,6	0,3	8,9
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	12,7	21,1	13,6	9,0	8,4	2,5	0,1	9,0
Kymenlaakso - Kymmenedalen	14,9	18,7	17,5	13,1	9,3	3,5	0,3	10,1
Etelä-Karjala - Södra Karelen	10,8	17,3	11,7	7,9	6,8	1,6	-	7,5
Etelä-Savo - Södra Savolax	11,6	16,0	9,8	4,9	5,4	2,3	-	6,6
Itä-Savo - Östra Savolax	13,2	18,1	8,4	8,1	5,5	3,5	0,9	7,6
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	12,5	15,7	12,7	11,5	6,6	3,2	0,2	8,3
Pohjois-Savo - Norra Savolax	12,3	17,9	10,4	9,3	7,2	2,2	-	8,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland	12,7	12,6	10,4	8,6	5,9	1,9	0,1	7,3
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	9,6	17,1	9,1	7,4	7,0	2,1	-	7,1
Vaasa - Vasa	12,4	16,6	11,2	10,3	9,1	4,8	0,2	9,1
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	9,0	10,0	6,8	9,3	3,8	2,0	-	5,7
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	13,6	16,2	12,0	7,7	6,7	3,2	0,2	8,6
Kainuu - Kajanaland	12,8	18,3	15,4	11,5	3,3	1,1	-	7,9
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	16,3	26,4	21,7	10,3	12,6	3,7	-	12,2
Lappi - Lappland	17,6	19,2	15,4	15,7	9,9	3,7	-	10,7
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	13,7	22,9	15,1	8,7	6,2	3,1	1,0	9,1
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	14,1	18,1	12,3	9,9	7,9	3,3	0,2	9,1

1) **Asuinkunnan mukaan.** Efter boendekommun. *According to domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden abortit tuhatta 15-19-vuotiaista naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19.

Taulukko 3: Raskaudeneskeytysten perusteet 1970, 1973-2006, %

Tabell 3: Indikationer för abort 1970, 1973-2006, %

Table 3: Indications for induced abortion 1970, 1973-2006, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social Social	Eettinen Etisk Ethical	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Täyttänyt 40 v. Fyllt 40 år Age 40 and over	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 ¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1973 ²⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ²⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ²⁾	6,0	74,8	-	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ²⁾	5,4	76,2	-	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 360
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 645
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 787
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 319
1987	1,7	83,4	0,0	4,8	7,1	1,8	1,1	0,1	0,0	100	12 986
1988	1,4	84,5	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	0,1	0,0	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	0,1	0,0	100	12 646
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	0,0	0,0	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	0,1	0,0	100	11 737
1992	0,8	85,3	0,0	4,3	6,2	1,6	1,7	0,0	0,0	100	11 069
1993	0,6	85,5	0,0	4,2	6,0	1,9	1,6	0,0	0,0	100	10 375
1994	0,5	85,4	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	0,0	0,0	100	10 013
1995	0,5	86,1	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 872
1996	0,4	86,8	0,0	3,7	4,8	2,3	2,1	0,0	0,0	100	10 423
1997	0,3	86,8	0,0	4,6	4,4	2,0	1,9	0,0	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 751
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 837
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	0,0	100	10 932
2001	0,4	84,1	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	100	10 819 ³⁾
2002	0,5	84,8	0,1	6,7	3,8	2,1	0,6	1,5	0,0	100	11 163
2003	0,5	85,0	0,1	6,6	3,5	1,9	1,0	1,4	0,0	100	10 970
2004	0,4	88,2	0,1	5,9	3,4	2,0	0,9	1,5	0,1	100	11 432
2005	0,5	86,9	0,1	6,2	4,0	2,2	0,9	1,8	0,0	100	11 250
2006	0,4	88,7	0,0	6,1	3,8	2,1	1,0	1,8	0,0	100	11 022

1) Nykyisen lain aikana. Under gällande lag. Under the current law.

2) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. Based on a sample.

3) Useampi peruste mahdollinen vuodesta 2001 lähtien. Flera indikationer möjliga sedan 2001. More than one indication possible since 2001.

Taulukko 4: Suoritetut raskaudeneskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2006

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2006

Table 4: Abortions by indication 2006

Siviilisäätö, ikä ja synnytysten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar Marital status, age and number of deliveries	Peruste - Indikation - Indication					4 lasta 4 barn 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä ¹⁾ Totalt Total
	Lääketiet. Medicinsk Medical	Sosiaalinen Social Social	Eettinen Etisk Ethical	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Yli 40 vuotta Över 40 år Age 40 and over						
Siviilisäätö - Civilstånd - Marital status											
Naimisissa - Gift - Married	21	1 655	2	1	191	131	58	115	-	4	2 178
Naimaton - Ogift - Single	20	6 996	2	638	122	46	43	64	-	1	7 932
Leski - Änka - Widowed	-	14	-	-	5	-	1	-	-	-	20
Eronnut - Frånskild - Divorced	4	758	-	-	76	40	3	7	-	1	889
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Yhteensä - Totalt - Total	45	9 426	4	639	394	217	105	186	-	6	11 022
Ikä - Ålder - Age ²⁾											
-13	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
14	-	5	-	62	-	-	-	-	-	-	67
15	-	22	-	184	-	-	-	-	-	-	206
16	-	85	-	322	-	-	-	2	-	-	409
17	-	430	-	68	-	-	1	2	-	-	501
18	-	572	-	-	-	-	-	1	-	-	573
19	1	633	-	-	-	-	2	-	-	-	636
20-24	5	2 908	2	-	-	2	13	19	-	-	2 949
25-29	12	1 904	-	-	-	25	21	41	-	-	2 003
30-34	9	1 386	1	-	-	61	26	51	-	-	1 534
35-39	11	1 203	1	-	-	89	18	38	-	3	1 363
40-44	7	265	-	-	364	36	21	31	-	3	727
45-50	-	13	-	-	30	4	3	1	-	-	51
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	45	9 426	4	639	394	217	105	186	-	6	11 022
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries											
0	15	4 943	1	634	49	-	44	69	-	-	5 755
1	8	1 840	2	5	79	-	42	66	-	-	2 042
2	13	1 670	1	-	145	2	9	33	-	1	1 874
3	5	781	-	-	78	9	5	9	-	5	892
4	1	136	-	-	30	148	2	8	-	-	325
5	3	36	-	-	10	45	1	-	-	-	95
6	-	16	-	-	-	9	-	-	-	-	25
7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
8	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	4
9-	-	2	-	-	3	2	1	-	-	-	8
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	45	9 426	4	639	394	217	105	186	-	6	11 022

1) Useampi peruste mahdollinen. Flera indikationer möjliga. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på ingreppsdagen. Age on the day of operation.

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2006

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2006

Table 5: Induced abortions by gestation length 1985-2006

Raskauden kesto, viikkoja															
Gestationslängd, veckor															
Gestation length, weeks															
	-6	7	8	9	10	11	12-13	14-15	16-17	18-19	20-21	22-	Tuntematon	Yhteensä	
N													Okänd	Totalt	
													Unknown	Total	
1985	1 850	2 588	3 073	2 637	1 983	943	156	216	191	139	7	4	-	13 787	
1986	1 947	2 595	2 980	2 459	1 783	869	134	192	156	175	13	13	-	13 316	
1987	1 801	2 329	2 951	2 486	1 765	962	142	204	128	166	30	9	13	12 986	
1988	1 886	2 284	2 722	2 367	1 828	982	133	198	172	115	26	23	2	12 738	
1989	1 893	2 245	2 693	2 448	1 798	858	144	221	152	157	17	16	4	12 646	
1990	1 847	2 227	2 693	2 285	1 680	812	156	202	129	130	42	12	2	12 217	
1991	1 939	2 327	2 565	2 126	1 466	669	164	191	119	128	29	14	-	11 737	
1992	1 919	2 212	2 374	1 987	1 340	628	136	168	133	126	33	13	-	11 069	
1993	1 878	2 118	2 306	1 809	1 158	550	129	159	133	102	24	9	-	10 375	
1994	1 989	2 107	2 140	1 615	1 096	461	114	177	135	124	34	21	-	10 013	
1995	1 888	2 130	2 089	1 661	1 079	436	144	170	124	108	29	14	-	9 872	
1996	2 020	2 179	2 273	1 641	1 102	600	149	170	135	115	25	10	4	10 423	
1997	2 084	2 223	2 253	1 556	1 087	465	163	173	109	101	26	9	1	10 250	
1998	2 256	2 446	2 293	1 596	1 075	459	184	161	125	113	27	13	3	10 751	
1999	2 323	2 448	2 318	1 549	1 098	456	174	200	134	98	25	13	1	10 837	
2000	2 605	2 372	2 233	1 583	1 036	431	155	230	134	120	25	8	-	10 932	
2001	3 553	2 290	1 727	1 212	915	358	192	189	151	106	31	14	-	10 738	
2002	3 780	2 400	1 697	1 096	877	383	245	191	141	113	36	15	-	10 974	
2003	3 845	2 464	1 623	959	783	377	207	190	151	103	42	23	-	10 767	
2004	4 042	2 487	1 713	992	739	409	242	244	150	92	27	25	-	11 162	
2005	4 151	2 394	1 674	916	686	345	266	214	156	102	40	23	2	10 969	
2006	4 037	2 375	1 606	885	643	340	216	203	160	114	40	20	6	10 645	
%															
1985	13,4	18,8	22,3	19,1	14,4	6,9	1,1	1,6	1,4	1,0	0,1	0,0	-	100	
1986	14,6	19,5	22,4	18,5	13,4	6,5	1,0	1,4	1,2	1,3	0,1	0,1	-	100	
1987	13,9	17,9	22,7	19,1	13,6	7,4	1,1	1,6	1,0	1,3	0,2	0,1	0,1	100	
1988	14,8	17,9	21,4	18,6	14,4	7,7	1,0	1,6	1,4	0,9	0,2	0,2	0,0	100	
1989	15,0	17,8	21,3	19,4	14,2	6,8	1,1	1,7	1,2	1,2	0,1	0,1	0,0	100	
1990	15,1	18,2	22,0	18,7	13,8	6,6	1,3	1,7	1,1	1,1	0,3	0,1	0,0	100	
1991	16,5	19,8	21,9	18,1	12,5	5,7	1,4	1,6	1,0	1,1	0,2	0,1	-	100	
1992	17,3	20,0	21,4	18,0	12,1	5,7	1,2	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	-	100	
1993	18,1	20,4	22,2	17,4	11,2	5,3	1,2	1,5	1,3	1,0	0,2	0,1	-	100	
1994	19,9	21,0	21,4	16,1	10,9	4,6	1,1	1,8	1,3	1,2	0,3	0,2	-	100	
1995	19,1	21,6	21,2	16,8	10,9	4,4	1,5	1,7	1,3	1,1	0,3	0,1	-	100	
1996	19,4	20,9	21,8	15,7	10,6	5,8	1,4	1,6	1,3	1,1	0,2	0,1	0,0	100	
1997	20,3	21,7	22,0	15,2	10,6	4,5	1,6	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1	0,0	100	
1998	21,0	22,8	21,3	14,8	10,0	4,3	1,7	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	0,0	100	
1999	21,4	22,6	21,4	14,3	10,1	4,2	1,6	1,8	1,2	0,9	0,2	0,1	0,0	100	
2000	23,8	21,7	20,4	14,5	9,5	3,9	1,4	2,1	1,2	1,1	0,2	0,1	-	100	
2001	33,1	21,3	16,1	11,3	8,5	3,3	1,8	1,8	1,4	1,0	0,3	0,1	-	100	
2002	34,4	21,9	15,5	10,0	8,0	3,5	2,2	1,7	1,3	1,0	0,3	0,1	-	100	
2003	35,7	22,9	15,1	8,9	7,3	3,5	1,9	1,8	1,4	1,0	0,4	0,2	-	100	
2004	36,2	22,3	15,3	8,9	6,6	3,7	2,2	2,2	1,3	0,8	0,2	0,2	-	100	
2005	37,8	21,8	15,3	8,4	6,3	3,1	2,4	2,0	1,4	0,9	0,4	0,2	0,0	100	
2006	37,9	22,3	15,1	8,3	6,0	3,2	2,0	1,9	1,5	1,1	0,4	0,2	0,1	100	

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2006

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2006

Table 6: Induced abortions by previous deliveries 1987-2006

		Aikaisemmat synnytykset						Tuntematon	Yhteensä
		Tidigare förlossningar						Okänd	Totalt
		Previous deliveries						Unknown	Total
		0	1	2	3	4	5-		
N									
1987		6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988		6 544	2 165	2 552	1 105	283	51	38	12 738
1989		6 418	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 646
1990		6 149	2 111	2 481	1 096	287	65	28	12 217
1991		5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992		5 334	2 133	2 254	991	262	77	18	11 069
1993		4 832	2 031	2 250	904	248	90	20	10 375
1994		4 596	1 957	2 171	945	239	94	11	10 013
1995		4 689	1 908	2 055	900	229	90	1	9 872
1996		4 877	1 986	2 195	998	287	78	2	10 423
1997		4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
1998		5 243	1 991	2 146	1 012	274	85	-	10 751
1999		5 432	1 951	2 133	984	245	92	-	10 837
2000		5 672	1 903	2 064	938	270	85	-	10 932
2001		5 495	1 962	2 011	913	249	107	1	10 738
2002		5 742	1 957	2 026	885	270	94	-	10 974
2003		5 684	1 920	1 924	880	256	103	-	10 767
2004		5 912	2 057	2 029	820	247	97	-	11 162
2005		5 827	2 016	1 876	857	273	120	-	10 969
2006		5 579	2 012	1 828	869	260	97	-	10 645
%									
1987		49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988		51,4	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989		50,8	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990		50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991		48,5	18,3	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992		48,2	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993		46,6	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994		45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995		47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996		46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997		48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
1998		48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
1999		50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
2000		51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001		51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002		52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100
2003		52,8	17,8	17,9	8,2	2,4	1,0	-	100
2004		53,0	18,4	18,2	7,3	2,2	0,9	-	100
2005		53,1	18,4	17,1	7,8	2,5	1,1	-	100
2006		52,4	18,9	17,2	8,2	2,4	0,9	-	100

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2006

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2006

Table 7: Induced abortions by previous abortions 1987-2006

Aikaisemmat keskeytykset								
Tidigare aborter								
Previous abortions								
	0	1	2	3	4	5-	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
N								
1987	9 453	2 529	537	144	33	13	277	12 986
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
1989	9 152	2 526	547	124	28	20	249	12 646
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
1992	7 701	2 455	620	147	45	23	78	11 069
1993	7 186	2 299	591	148	41	17	93	10 375
1994	6 931	2 132	602	141	44	29	134	10 013
1995	6 911	2 155	578	154	47	24	3	9 872
1996	7 247	2 274	663	174	35	28	2	10 423
1997	7 172	2 185	626	183	44	26	14	10 250
1998	7 580	2 262	642	182	58	27	-	10 751
1999	7 776	2 184	624	171	52	29	1	10 837
2000	7 770	2 257	649	172	55	29	-	10 932
2001	7 595	2 250	621	189	48	33	2	10 738
2002	7 703	2 277	687	218	49	38	2	10 974
2003	7 356	2 385	699	198	84	45	-	10 767
2004	7 612	2 413	788	232	67	49	1	11 162
2005	7 467	2 366	763	237	74	60	2	10 969
2006	7 110	2 393	749	255	81	56	1	10 645
%								
1987	72,8	19,5	4,1	1,1	0,3	0,1	2,1	100,0
1988	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,1	1,8	100,0
1989	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,2	2,0	100,0
1990	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,2	0,7	100,0
1991	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,2	1,0	100,0
1992	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,2	0,7	100,0
1993	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,2	0,9	100,0
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100,0
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100,0
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100,0
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,3	0,1	100,0
1998	70,5	21,0	6,0	1,7	0,5	0,3	-	100,0
1999	71,8	20,2	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100,0
2000	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100,0
2001	70,7	21,0	5,8	1,8	0,4	0,3	0,0	100,0
2002	70,2	20,7	6,3	2,0	0,4	0,3	0,0	100,0
2003	68,3	22,2	6,5	1,8	0,8	0,4	-	100,0
2004	68,2	21,6	7,1	2,1	0,6	0,4	0,0	100,0
2005	68,1	21,6	7,0	2,2	0,7	0,5	0,0	100,0
2006	66,8	22,5	7,0	2,4	0,8	0,5	0,0	100,0

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2006, %

Tabell 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989-2006, %

Table 8: Contraceptives used by abortion patients 1980, 1985, 1989-2006, %

	Pilleri ¹⁾ P-piller Pill	Kohdun- sisäinen hormoni- ehkäisin Hormonspiral Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu ehkäisy- menetelmä Annat preventivmedel Other contraceptives	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänt Unknown	Jälkiehkäisy ²⁾ Akut p-piller Post-coital oral contraceptive	Yhteensä ³⁾ Totalt Total
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	6,1	..	8,3	43,5	..	5,0	35,5	4,9	..	103,3
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	35,8	4,1	..	102,9
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	35,6	4,5	..	102,6
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	36,7	4,7	..	102,9
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	34,5	4,6	..	102,5
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	34,0	5,5	..	102,9
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	5,7	..	102,8
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	6,0	..	103,1
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	5,9	..	102,4
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	6,2	..	102,7
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	5,0	1,0	103,2
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	4,6	1,3	103,7
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	4,7	0,9	103,3
2001	8,6	0,1	1,4	49,9	0,4	1,7	35,7	3,5	1,2	102,5
2002	9,1	0,2	1,3	49,7	0,4	1,7	35,7	4,8	1,5	104,4
2003	9,8	0,3	1,0	47,8	0,2	2,4	35,5	5,9	2,3	105,2
2004	9,8	0,2	1,0	46,6	0,3	3,4	36,4	4,6	2,1	104,4
2005	9,2	0,3	0,9	46,4	0,4	3,6	37,0	4,7	2,7	105,2
2006	9,4	0,2	0,7	45,4	0,3	3,1	38,3	5,0	2,7	105,1

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983-2006, %

Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983-2006, %

Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after abortion 1983-2006, %

	Pilleri ¹⁾ P-piller Pill	Kohdun- sisäinen hormoni- ehkäisin Hormonspiral Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu ehkäisy- menetelmä Annat preventivmedel Other contraceptives	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä ³⁾ Totalt Total
1983	33,1	..	47,6	2,4	..	6,3	1,3	9,4	100,0
1984	29,2	..	48,2	2,0	..	9,6	1,3	9,7	100,0
1985	26,9	..	48,8	2,2	..	12,2	1,3	10,4	101,7
1986	51,7	..	23,9	2,7	..	12,1	1,3	9,6	101,3
1987	53,0	..	22,9	3,0	..	12,4	1,2	9,2	101,7
1988	56,1	..	21,9	3,0	..	11,0	1,3	8,0	101,3
1989	57,7	..	19,5	3,2	..	11,2	1,3	8,3	101,2
1990	57,5	..	20,3	3,2	..	10,6	1,6	8,0	101,2
1991	54,8	..	22,5	2,6	0,1	10,5	1,4	9,3	101,2
1992	54,9	..	24,4	2,6	6,9	2,7	0,9	8,4	100,7
1993	57,0	..	22,7	3,0	8,0	1,3	1,1	7,9	101,0
1994	57,4	..	21,9	2,7	8,1	1,1	1,4	8,5	101,1
1995	56,6	..	21,9	3,1	8,1	0,8	1,4	8,5	100,4
1996	53,7	..	22,8	3,5	8,9	0,5	1,2	9,4	100,1
1997	57,6	..	21,7	3,2	7,9	0,8	1,2	8,4	100,8
1998	59,6	5,6	15,6	4,3	8,3	0,8	1,3	6,5	102,0
1999	60,4	7,0	15,1	3,8	7,2	1,0	1,1	6,4	102,0
2000	63,3	7,2	13,7	3,5	6,2	0,8	1,4	6,4	102,5
2001	61,7	8,1	14,2	3,6	6,0	0,7	1,3	5,9	101,5
2002	61,6	9,1	12,8	3,6	5,7	1,0	1,4	6,9	102,1
2003	57,6	9,6	11,8	3,3	4,3	7,0	1,7	7,2	102,5
2004	53,5	10,0	11,5	3,6	3,8	11,8	1,3	7,2	102,7
2005	53,7	11,5	10,9	3,1	3,5	11,5	1,3	7,2	102,7
2006	52,7	13,5	10,0	3,1	3,0	12,8	1,2	7,2	103,5

1) Vuodesta 1998 e-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämns. No mention of other contraceptive.

3) Useampi menetelmä mahdollinen. Flera metoder möjliga. More than one method possible.

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000-2006

Tabell 10: Abortmetoder 2000-2006

Table 10: Methods for induced abortion 2000-2006

	Laajennus, imukaavinta Dilatation, exeres med vakuumas-p. <i>Dilation, suction currettage</i>	Laajennus, tyhjennys, imukaavinta Dilatation, exeres med curettege <i>Dilation, evacuation, suction currettage</i>	Varhaisuimu Tidig utrymning med sug <i>Early suction</i>	Abortiivaine Abortiv- medel <i>Abortion agent</i>	Prostaglandiini tai muu lääke Prostaglandin eller annat läkemedel <i>Prostaglandin or other drug</i>	Mifegyne Mifegyne <i>Mifegyne</i>	Keisari- leikkaus Kejsarsnitt <i>Caesarean section</i>	Muu Annat <i>Other</i>	Tuntematon Okänd <i>Unknown</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>
2000	9 230	339	191	485	246	430	3	8	-	10 932
2001	7 204	232	159	532	400	2 195	5	11	-	10 738
2002	6 013	139	142	607	413	3 653	3	4	-	10 974
2003	5 006	112	104	658	541	4 339	2	5	-	10 767
2004	4 574	125	83	720	703	4 946	2	8	1	11 162
2005	3 740	96	94	748	472	5 808	-	9	2	10 969
2006	3 140	83	66	729	485	6 125	1	10	6	10 645
%										
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	2,3	3,9	0,0	0,1	-	100
2001	67,1	2,2	1,5	5,0	3,7	20,4	0,0	0,1	-	100
2002	54,8	1,3	1,3	5,5	3,8	33,3	0,0	0,0	-	100
2003	46,5	1,0	1,0	6,1	5,0	40,3	0,0	0,0	-	100
2004	41,0	1,1	0,7	6,5	6,3	44,3	0,0	0,1	0,0	100
2005	34,1	0,9	0,9	6,8	4,3	52,9	-	0,1	0,0	100
2006	29,5	0,8	0,6	6,8	4,6	57,5	0,0	0,1	0,1	100
Ennen 13. viikkoa / Före vecka 13 / Before 13th week										
2000	9 141	284	191	14	207	419	-	4	-	10 260
2001	7 120	197	159	22	372	2 180	-	5	-	10 055
2002	5 952	109	142	15	370	3 645	-	-	-	10 233
2003	4 962	87	104	17	540	4 339	-	2	-	10 051
2004	4 527	99	83	19	703	4 946	1	3	1	10 382
2005	3 688	83	94	18	472	5 807	-	4	2	10 168
2006	3 115	72	66	20	484	6 125	-	4	6	9 892
%										
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,0	4,1	-	0,0	-	100
2001	70,8	2,0	1,6	0,2	3,7	21,7	-	0,0	-	100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	3,6	35,6	-	-	-	100
2003	49,4	0,9	1,0	0,2	5,4	43,2	-	-	0,0	100
2004	43,6	1,0	0,8	0,2	6,8	47,6	0,0	0,0	0,0	100
2005	36,3	0,8	0,9	0,2	4,6	57,1	-	-	0,0	100
2006	31,5	0,7	0,7	0,2	4,9	62,0	-	-	0,0	100
13. viikolla tai sen jälkeen / Vecka 13 eller efter / 13th week or later										
2000	89	55	-	471	39	11	3	4	-	672
2001	84	35	-	510	28	15	5	3	-	683
2002	61	30	-	592	43	8	3	4	-	741
2003	44	25	-	641	1	-	2	3	-	716
2004	47	26	-	701	-	-	1	5	-	780
2005	52	13	-	730	-	1	-	5	-	801
2006	25	11	-	709	1	-	1	6	-	753
%										
2000	13,2	8,2	-	70,1	5,8	1,6	0,4	0,6	-	100
2001	12,3	5,1	-	74,7	4,1	2,2	0,7	0,4	-	100
2002	8,2	4,0	-	79,9	5,8	1,1	0,4	0,5	-	100
2003	6,1	3,5	-	89,5	0,1	-	0,3	0,4	-	100
2004	6,0	3,3	-	89,9	-	-	0,1	0,6	-	100
2005	6,5	1,6	-	91,1	-	0,1	-	0,6	-	100
2006	3,3	1,5	-	94,2	0,1	-	0,1	0,8	-	100

Taulukko 11: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951-2006

Tabell 11: Steriliseringar efter kön 1951-2006

Table 11: Sterilisations by sex 1951-2006

Vuosi	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä
År	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Year	Women	Men	Total	Women	Men	Total	Women	Men	Total
	N			%			Per 1000 25-54 v. / år / year		
1951	771	10	781	98,7	1,3	100	0,9	0,0	0,5
1952	1 006	10	1 016	99,0	1,0	100	1,2	0,0	0,6
1953	1 044	20	1 064	98,1	1,9	100	1,2	0,0	0,6
1954	1 048	21	1 069	98,0	2,0	100	1,2	0,0	0,6
1955	1 227	9	1 236	99,3	0,7	100	1,4	0,0	0,7
1956	1 548	34	1 582	97,9	2,1	100	1,8	0,0	0,9
1957	1 694	34	1 728	98,0	2,0	100	1,9	0,0	1,0
1958	2 176	32	2 208	98,6	1,4	100	2,5	0,0	1,3
1959	2 536	61	2 597	97,7	2,3	100	2,9	0,1	1,5
1960	3 154	46	3 200	98,6	1,4	100	3,6	0,1	1,9
1961	3 152	47	3 199	98,5	1,5	100	3,6	0,1	1,9
1962	3 350	39	3 389	98,8	1,2	100	3,8	0,0	2,0
1963	3 481	30	3 511	99,1	0,9	100	4,0	0,0	2,1
1964	3 256	42	3 298	98,7	1,3	100	3,7	0,1	2,0
1965	3 183	23	3 206	99,3	0,7	100	3,7	0,0	1,9
1966	3 516	27	3 543	99,2	0,8	100	4,1	0,0	2,1
1967	4 010	12	4 022	99,7	0,3	100	4,6	0,0	2,4
1968	4 276	18	4 294	99,6	0,4	100	4,9	0,0	2,5
1969	5 437	12	5 449	99,8	0,2	100	6,3	0,0	3,2
1970	5 677	50	5 727	99,1	0,9	100	6,6	0,1	3,4
1971	3 990	270	4 260	93,7	6,3	100	4,5	0,3	2,5
1972	3 330	377	3 707	89,8	10,2	100	3,7	0,4	2,1
1973	2 746	279	3 025	90,8	9,2	100	3,0	0,3	1,7
1974	2 214	209	2 423	91,4	8,6	100	2,4	0,2	1,3
1975	2 221	154	2 375	93,5	6,5	100	2,3	0,2	1,3
1976	1 970	188	2 158	91,3	8,7	100	2,1	0,2	1,1
1977	1 942	209	2 151	90,3	9,7	100	2,0	0,2	1,1
1978	2 085	225	2 310	90,3	9,7	100	2,1	0,2	1,2
1979	2 172	226	2 398	90,6	9,4	100	2,2	0,2	1,2
1980	2 747	188	2 935	93,6	6,4	100	2,8	0,2	1,5
1981	3 422	205	3 627	94,3	5,7	100	3,4	0,2	1,8
1982	4 493	214	4 707	95,5	4,5	100	4,5	0,2	2,3
1983	4 867	224	5 091	95,6	4,4	100	4,8	0,2	2,5
1984	5 585	225	5 810	96,1	3,9	100	5,5	0,2	2,8
1985	8 675	558	9 233	94,0	6,0	100	8,4	0,5	4,4
1986	11 753	853	12 606	93,2	6,8	100	11,3	0,8	6,0
1987	12 083	695	12 778	94,6	5,4	100	11,5	0,6	6,0
1988	11 954	589	12 543	95,3	4,7	100	11,3	0,5	5,8
1989	12 392	611	13 003	95,3	4,7	100	11,6	0,6	6,0
1990	12 864	593	13 457	95,6	4,4	100	11,9	0,5	6,1
1991	12 782	512	13 294	96,1	3,9	100	11,7	0,5	6,0
1992	12 234	505	12 739	96,0	4,0	100	11,1	0,4	5,7
1993	11 074	480	11 554	95,8	4,2	100	10,0	0,4	5,1
1994	10 926	598	11 524	94,8	5,2	100	9,8	0,5	5,1
1995	10 521	792	11 313	93,0	7,0	100	9,4	0,7	5,0
1996	12 561	1 810	14 371	87,4	12,6	100	11,3	1,6	6,3
1997	10 992	2 202	13 194	83,3	16,7	100	9,9	1,9	5,8
1998	9 596	1 921	11 517	83,3	16,7	100	8,6	1,7	5,1
1999	9 041	1 798	10 839	83,4	16,6	100	8,1	1,6	4,8
2000	8 699	1 772	10 471	83,1	16,9	100	7,9	1,6	4,7
2001	7 263	1 766	9 029	80,4	19,6	100	6,6	1,6	4,0
2002	6 726	1 594	8 320	80,8	19,2	100	6,2	1,4	3,8
2003	5 906	1 642	7 548	78,2	21,8	100	5,5	1,5	3,5
2004	5 656	1 614	7 270	77,8	22,2	100	5,3	1,5	3,4
2005	5 103	1 821	6 924	73,7	26,3	100	4,8	1,7	3,2
2006	3 822	1 474	5 296	72,2	27,8	100	3,6	1,4	2,5

Taulukko 12: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2006

Tabell 12: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2006

Table 12: Sterilisations by hospital district 2006

Sairaanhoitopiiri ⁽¹⁾

Sjukvårdsdistrikt

Hospital district

	Steriloinnit-Steriliseringar-Sterilisations					
	Naiset-Kvinnor-Women		Miehet-Män-Men		Yhteensä-Totalt-Total	
	N	Per 1000 ²⁾	N	Per 1000 ²⁾	N	Per 1000 ²⁾
Koko maa	3 822	3,6	1 474	1,4	5 296	2,5
- Hela landet - <i>Whole country</i>						
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	855	2,6	410	1,3	1 265	2,0
- Uusimaa - Nyland	656	3,4	321	1,7	977	2,5
- Helsinki - Helsingfors	199	1,5	89	0,7	288	1,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	496	5,4	135	1,5	631	3,4
Satakunta - Satakunta	152	3,6	92	2,1	244	2,9
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	103	3,2	102	3,0	205	3,1
Pirkanmaa - Birkaland	272	2,9	152	1,6	424	2,2
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	140	3,5	41	1,0	181	2,2
Kymenlaakso - Kymmenedalen	153	4,5	38	1,1	191	2,7
Etelä-Karjala - Södra Karelen	99	4,1	49	1,9	148	3,0
Etelä-Savo - Södra Savolax	66	3,5	36	1,8	102	2,7
Itä-Savo - Östra Savolax	48	4,4	14	1,2	62	2,8
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	141	4,5	33	1,0	174	2,7
Pohjois-Savo - Norra Savolax	206	4,4	105	2,1	311	3,2
Keski-Suomi - Mellersta Finland	97	1,9	70	1,3	167	1,6
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	174	5,0	23	0,6	197	2,7
Vaasa - Vasa	85	2,8	22	0,7	107	1,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	98	7,0	19	1,3	117	4,1
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	390	5,3	71	0,9	461	3,0
Kainuu - Kajanaland	62	4,2	18	1,1	80	2,6
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	58	4,8	24	1,8	82	3,2
Lappi - Lappland	96	4,3	18	0,7	114	2,4
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	28	5,1	-	-	28	2,6
Ulkomaat - Utlandet - <i>Foreign countries</i>	1	-	-	-	1	-
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	2	-	2	-	4	-

1) **Asuinkunnan mukaan.** Efter boendekommun. *According to municipality of residence.*

2) **Tuhatta 25-54 v. naista/miestä kohti.** Per 1 000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år
Per 1000 women/men aged 25-54.

Taulukko 13: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2006

Tabell 13: Sterilisering av kvinnor efter åldersgrupp 1994-2006

Table 13: Female sterilisations by age 1994-2006

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
N													
-24	35	41	43	36	25	30	29	23	23	24	21	20	13
25-29	428	382	467	343	322	269	263	209	201	182	180	161	138
30-34	2 485	2 387	2 766	2 412	2 056	2 022	1 771	1 469	1 334	1 116	989	972	727
35-39	4 247	3 998	4 903	4 252	3 769	3 657	3 579	2 866	2 762	2 370	2 317	2 013	1 524
40-44	3 146	3 143	3 734	3 410	2 930	2 661	2 642	2 383	2 107	1 924	1 889	1 706	1 222
45-49	579	566	643	527	489	398	409	309	295	286	255	228	192
50-54	6	3	5	11	5	4	6	4	-	4	5	3	3
Tuntematon - Okänd	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	3
<i>Unknown</i>													
Yhteensä - Totalt	10 926	10 521	12 561	10 992	9 596	9 041	8 699	7 263	6 726	5 906	5 656	5 103	3 822
<i>Total</i>													
%													
-24	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
25-29	3,9	3,6	3,7	3,1	3,4	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,6
30-34	22,7	22,7	22,0	21,9	21,4	22,4	20,4	20,2	19,8	18,9	17,5	19,0	19,0
35-39	38,9	38,0	39,0	38,7	39,3	40,4	41,1	39,5	41,1	40,1	41,0	39,4	39,9
40-44	28,8	29,9	29,7	31,0	30,5	29,4	30,4	32,8	31,3	32,6	33,4	33,4	32,0
45-49	5,3	5,4	5,1	4,8	5,1	4,4	4,7	4,3	4,4	4,8	4,5	4,5	5,0
50-54	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Tuntematon - Okänd	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
<i>Unknown</i>													
Yhteensä - Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>													
Per 1000													
25-29	2,4	2,2	2,8	2,1	2,1	1,8	1,8	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
30-34	13,3	12,8	14,9	13,1	11,3	11,4	10,3	8,8	8,3	7,2	6,6	6,5	4,8
35-39	22,2	21,1	26,1	22,8	20,2	19,6	19,2	15,5	15,0	13,0	13,0	11,6	9,1
40-44	15,6	15,7	18,8	17,3	15,1	13,9	14,0	12,7	11,3	10,3	10,1	9,2	6,6
45-49	2,8	2,7	3,0	2,5	2,4	2,0	2,1	1,6	1,5	1,5	1,3	1,2	1,0
50-54	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
25-54	9,8	9,4	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2	5,5	5,3	4,8	3,6

Taulukko 14: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2006

Tabell 14: Sterilisering av män efter åldersgrupp 1994-2006

Table 14: Male sterilisations by age 1994-2006

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
N													
-24	-	-	3	1	7	1	4	4	5	3	2	2	1
25-29	17	17	42	30	32	32	28	44	34	26	23	32	25
30-34	107	147	328	415	347	336	309	290	298	258	249	282	233
35-39	199	271	575	704	615	575	596	557	507	553	489	564	445
40-44	152	204	496	604	555	491	506	529	440	463	485	538	429
45-49	86	108	266	319	263	241	230	240	215	242	252	271	233
50-54	37	45	100	129	102	122	99	102	94	97	114	132	107
Tuntematon - Okänd	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
<i>Unknown</i>													
Yhteensä - Totalt	598	792	1 810	2 202	1 921	1 798	1 772	1 766	1 594	1 642	1 614	1 821	1474
<i>Total</i>													
%													
-24	-	-	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
25-29	2,8	2,1	2,3	1,4	1,7	1,8	1,6	2,5	2,1	1,6	1,4	1,8	1,7
30-34	17,9	18,6	18,1	18,8	18,1	18,7	17,4	16,4	18,7	15,7	15,4	15,5	15,8
35-39	33,3	34,2	31,8	32,0	32,0	32,0	33,6	31,5	31,8	33,7	30,3	31,0	30,2
40-44	25,4	25,8	27,4	27,4	28,9	27,3	28,6	30,0	27,6	28,2	30,0	29,5	29,1
45-49	14,4	13,6	14,7	14,5	13,7	13,4	13,0	13,6	13,5	14,7	15,6	14,9	15,8
50-54	6,2	5,7	5,5	5,9	5,3	6,8	5,6	5,8	5,9	5,9	7,1	7,2	7,3
Tuntematon - Okänd	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
<i>Unknown</i>													
Yhteensä - Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>													
Per 1000													
25-29	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
30-34	0,5	0,8	1,7	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,8	1,5
35-39	1,0	1,4	3,0	3,6	3,2	3,0	3,1	2,9	2,6	2,9	2,6	3,1	2,6
40-44	0,7	1,0	2,4	3,0	2,8	2,5	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5	2,8	2,2
45-49	0,4	0,5	1,2	1,5	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,4	1,2
50-54	0,3	0,3	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5
25-54	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,7	1,4

Taulukko 15: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2006

Tabell 15: Sterilisering av kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlösningar 2006

Table 15: Female sterilisations by indication, marital status, age and previous deliveries 2006

	Synnyttänyt 3 lasta Fött 3 barn Given birth to 3 children	3 alaikäistä lasta 3 omyndiga barn 3 children aged under 18	Yli 30 vuotta Över 30 år Age 30 and over	Lääkettiet. Medicinsk Medical	Ehkäisy- vaikeudet Svårigheter att förhindra en graviditet Difficulties in contra- ception	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppsyte hos barn Serious disease or defect of offspring	Raj. kyky huolhtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä ¹⁾ Totalt Total
Siviilisäätty - Civilstånd - Marital status									
Naimisissa - Gift - Married	1 307	66	2 322	37	119	-	-	1	3 852
Naimaton - Ogift - Single	304	15	790	8	67	-	9	2	1 195
Leski - Änka - Widowed	17	1	28	-	-	-	-	-	46
Eronnut - Fränskild - Divorced	242	19	516	3	40	-	-	-	820
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Ikä - Ålder - Age²⁾									
-19	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20-24	7	-	-	-	-	-	5	-	12
25-29	108	8	-	19	22	-	3	1	161
30-34	447	26	726	9	48	-	-	1	1 257
35-39	755	41	1 517	9	84	-	-	-	2 406
40-44	490	24	1 217	10	60	-	-	1	1 802
45-49	61	2	192	1	12	-	-	-	268
50-	2	-	3	-	-	-	-	-	5
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlösningar - Previous deliveries									
0	-	-	182	1	12	-	9	1	205
1	1	6	390	4	28	-	-	1	430
2	50	14	1 374	23	109	-	-	1	1 571
3	1 149	42	1 084	6	55	-	-	-	2 336
4	434	21	401	2	16	-	-	-	874
5	146	10	137	5	5	-	-	-	303
6	46	4	45	2	-	-	-	-	97
7	14	1	14	-	1	-	-	-	30
8	11	1	11	1	-	-	-	-	24
9-	19	2	19	-	-	-	-	-	40
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	1	4	-	-	-	-	5
Yhteensä - Totalt - Total	1 870	101	3 658	48	226	-	9	3	5 915

1) Useampi peruste mahdollinen. Flera indikationer möjliga. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på ingreppsdagen. Age on the day of operation.

Taulukko 16: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2006

Tabell 16: Sterilisering av män efter indikation, civilstånd och ålder 2006

Table 16: Male sterilisations by indication, marital status and age 2006

	3 alaikäistä lasta 3 omyndiga barn <i>3 children aged under 18</i>	Yli 30 vuotta Över 30 år <i>Age 30 and over</i>	Lääkietiet. Medicinsk <i>Medical</i>	Ehkäisy-vaikkeudet Svårigheter att förhindra en graviditet <i>Difficulties in contraception</i>	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppsslyte hos barn <i>Serious disease or defect of offspring</i>	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn <i>Limited ability to take care of children</i>	Tuntematon Okänd <i>Unknown</i>	Yhteensä ¹⁾ Totalt <i>Total</i>
Siviilisäätty - Civilstånd - Marital status								
Naimisissa - Gift - <i>Married</i>	289	1 086	-	44	1	-	1	1 421
Naimaton - Ogift - <i>Single</i>	19	154	-	11	-	1	1	186
Leski - Änka - <i>Widowed</i>	1	13	-	-	-	-	-	14
Eronnut - Frånskild - <i>Divorced</i>	33	189	-	2	-	-	-	224
Tuntematon - Okänt - <i>Unknown</i>	1	3	-	-	-	-	-	4
Ikä - Ålder - Age ²⁾								
-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	-	-	1	-	-	-	2
25-29	21	-	-	4	-	-	-	25
30-34	61	233	-	10	-	-	-	304
35-39	116	444	-	13	1	1	-	575
40-44	96	427	-	20	-	-	2	545
45-49	27	233	-	8	-	-	-	268
50-	20	107	-	1	-	-	-	128
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	1	1	-	-	-	-	-	2
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	343	1 445	-	57	1	1	2	1 849

1) Useampi peruste mahdollinen. Flera indikationer möjliga. *More than one indication possible.*

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på ingreppsdagen. *Age on the day of operation.*

Taulukko 17. Raskaudenkeskeytys- ja sterilisointirekisterin aikasarjoja, keskeytykset 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006

Table 17. Register över aborter och steriliseringar, tidsserier för aborter 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006

Table 17. Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilizations, induced abortions 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006

RASKAUDENKESKEYTYKSET / ABORTER / INDUCED ABORTIONS																
	1975	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Keskeytyksiä / Aborter / Abortions	21 547	15 037	13 787	12 217	9 872	10 423	10 250	10 751	10 837	10 932	10 738	10 974	10 767	11 162	10 969	10 645
tuhatta 15-49 v. naista kohden / per 1 000 kvinnor i åldern 15-49 år / per 1000 women aged 15-49	17,9	12,3	11,0	9,7	7,8	8,3	8,2	8,7	8,8	9,0	8,9	9,1	9,0	9,4	9,3	9,1
tuhatta elävänä syntynyttä kohden / per 1 000 levande födda / per 1000 live births	327,9	238,4	220,3	186,6	157,1	172,3	173,6	189,3	188,6	193,3	192,5	198,3	190,7	193,9	190,3	180,8
Ikä / Ålder / Age %																
< 20 v / år / yrs	19,2	24,1	25,8	18,8	17,9	17,4	18,7	19,5	21,1	22,0	23,2	23,6	22,4	22,0	21,3	20,9
20-24 v / år / yrs	24,7	24,5	23,7	25,6	21,9	21,7	21,9	22,1	23,1	23,4	22,4	24,1	25,3	26,9	27,1	27,7
25-34 v / år / yrs	35,1	31,7	29,5	34,0	40,7	41,7	40,4	39,1	36,7	35,5	35,2	33,4	33,3	32,7	33,0	32,8
≥ 35 v / år / yrs	20,9	19,8	20,8	21,6	19,5	19,2	19,1	19,3	19,1	19,1	19,2	18,8	19,0	18,4	18,6	18,5
Ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor / By age group per 1000 women																
15-19 v / år / yrs	21,2	19,4	20,7	15,6	11,0	11,4	12,0	13,0	14,1	14,8	15,4	16,3	15,3	15,7	15,0	14,1
20-24 v / år / yrs	26,0	19,7	17,6	18,3	14,5	15,1	14,6	15,1	15,7	16,0	15,0	16,6	17,0	18,5	18,2	18,1
25-29 v / år / yrs	22,0	12,2	11,3	12,5	12,9	13,8	13,3	13,6	13,7	13,0	13,2	12,6	12,3	12,7	12,8	12,3
30-34 v / år / yrs	17,6	11,0	9,8	9,8	9,6	11,0	10,9	11,7	10,9	11,2	10,8	10,7	10,7	10,7	10,4	9,9
35-39 v / år / yrs	17,1	10,3	9,1	7,4	6,6	7,1	7,1	7,7	7,7	7,9	7,6	7,7	8,0	7,9	7,9	7,9
40-44 v / år / yrs	13,2	8,2	5,1	4,7	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9	3,0	3,3	3,3	2,9	3,2	3,4	3,3
45-49 v / år / yrs	1,7	1,7	0,8	0,9	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Aiempiä synnytyksiä / Tidigare förlösningsar / Previous deliveries %																
0	45,8	51,8	50,4	50,3	47,5	46,8	48,6	48,8	50,1	51,9	51,2	52,3	52,8	53,0	53,1	52,4
1	18,8	16,4	16,3	17,3	19,3	19,1	17,9	18,5	18,0	17,4	18,3	17,8	17,8	18,4	18,4	18,9
2+	35,3	31,8	33,4	32,2	33,2	34,1	33,5	32,7	31,9	30,7	30,5	29,8	29,4	28,6	28,5	28,7
Aiempiä keskeytyksiä / Tidigare aborter / Previous abortions %																
0	-	-	75,9	72,9	70,0	69,5	70,1	70,5	71,8	71,1	70,7	70,2	68,3	68,2	68,1	66,8
1	-	-	18,7	20,4	21,8	21,8	21,3	21,0	20,1	20,6	21,0	20,8	22,2	21,6	21,6	22,5
2+	-	-	5,5	6,1	8,1	8,6	8,6	8,5	8,1	8,3	8,3	9,0	9,5	10,2	10,3	10,7
Keskeytyksen peruste / Indikation för abort / Indication for induced abortion % 1)																
sosiaalinen / social / social	74,8	77,6	82,9	83,9	86,1	86,8	86,8	85,8	85,8	84,3	84,1	84,8	85,0	88,2	86,9	88,7
nainen / kvinna / woman < 17 v / år / y	5,2	7,5	5,5	4,5	3,9	3,7	4,6	5,4	6,1	7,5	7,1	6,7	6,6	5,9	6,2	6,1
≥ 40 v / år / y	7,8	7,6	6,2	7,4	5,5	4,8	4,4	4,2	4,2	3,9	4,2	3,8	3,5	3,4	4,0	3,8
synnyttänyt vähintään 4 lasta / fött minst 4 barn / given birth to at least 4 children	4,8	2,2	2,1	1,8	2,0	2,3	2,0	2,2	1,7	1,8	2,0	2,1	1,9	2,0	2,2	2,1
sikiövaurio / fosterskada / foetal defect	1,1	1,0	0,6	1,6	2,0	2,2	1,9	2,1	1,9	2,2	2,2	2,1	2,5	2,4	2,7	2,8
muut perusteet / andra indikationer / other indications 2)	6,3	4,1	2,7	0,8	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4
Raskauden kesto / gestationslängd / gestation length %																
< 8 rvk / gv / gwk	-	-	32,2	33,3	40,7	40,3	42,0	43,7	44,0	45,5	54,4	56,3	58,6	58,5	59,7	60,3
8-11 rvk / gv / gwk	-	-	62,6	61,1	53,3	53,9	52,3	50,4	50,0	48,3	39,2	36,9	34,8	34,6	33,0	32,7
> 12 rvk / gv / gwk	-	-	5,2	5,5	6,0	5,8	5,7	5,8	5,9	6,1	6,4	6,8	6,6	7,0	7,3	7,1
> 20+ rvk / gv / gwk	-	-	0,1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6
Yli 20 rvk:n keskeytykset / Aborter efter graviditetsv. 20 / Abortions after 20th week of gestation																
lkm - antal - number	-	-	11,0	54,0	43,0	35,0	35,0	40,0	38,0	33,0	45,0	51,0	65,0	52,0	63,0	60,0
Sterilointi keskeytyksen yhteydessä / Sterilisering i anslutning till abort / Sterilisation done alongside abortion, %	3,0	1,8	3,8	4,3	4,3	4,7	4,2	4,2	3,2	2,9	1,9	1,9	1,2	1,0	1,0	0,7
Lääkkeellinen keskeytys / Mifegyne / Mifegyne, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	20,4	33,3	40,3	44,3	52,9	57,5
Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy / Preventivmedel använda av abortpatienter / Contraceptives used by abortion patients																
pilleri / p-piller / pill	-	4,6	6,1	7,7	7,8	7,4	7,8	7,2	7,9	8,5	8,6	9,1	9,8	9,8	9,2	9,4
kohdunsisäinen hormoniehkäisy / hormonspiral / hormone releasing IUD	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
kierukka / spiral / IUD	-	10,9	8,3	5,2	3,5	3,1	2,4	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,0	1,0	0,9	0,7
kondomi / kondom / condom	-	41,8	43,5	45,7	47,7	49,1	49,9	50,0	50,5	49,7	49,9	49,7	47,8	46,6	46,4	45,4
sterilointi / sterilisering / sterilisation	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3
muu ehkäisymenetelmä / annat preventivmedel / other contraceptive	-	5,0	5,0	3,9	3,2	2,9	3,1	2,2	1,9	1,9	1,7	1,7	2,4	3,4	3,6	3,1
ei mitään / ingenting / none	-	32,2	35,5	35,6	34,4	33,6	32,8	35,1	35,1	35,5	35,7	35,7	35,5	36,4	37,0	38,3
tuntamaton / okänd / unknown	-	5,4	4,9	4,5	6,0	5,9	6,2	5,0	4,6	4,7	3,5	4,8	5,9	4,6	4,7	5,0
jälkiehkäisy / akut p-piller / post-coital oral contraceptive	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	0,9	1,2	1,5	2,3	2,1	2,7	2,7
Suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen / Planerad preventivmetod efter aborten / Contraceptives planned for abortion patient																
pilleri / p-piller / pill	-	-	26,9	57,5	56,6	53,7	57,6	59,6	60,4	63,3	61,7	61,6	57,6	53,5	53,7	52,7
kohdunsisäinen hormoniehkäisy / hormonspiral / hormone releasing IUD	-	-	-	-	-	-	-	5,6	7,0	7,2	8,1	9,1	9,6	10,0	11,5	13,5
kierukka / spiral / IUD	-	-	48,8	20,3	21,9	22,8	21,7	15,6	15,1	13,7	14,2	12,8	11,8	11,5	10,9	10,0
kondomi / kondom / condom	-	-	2,2	3,2	3,1	3,5	3,2	4,3	3,8	3,5	3,6	3,6	3,3	3,6	3,1	3,1
sterilointi / sterilisering / sterilisation	-	-	-	-	8,1	8,9	7,9	8,3	7,2	6,2	6,0	5,7	4,3	3,8	3,5	3,0
muu ehkäisymenetelmä / annat preventivmedel / other contraceptive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ei mitään / ingenting / none	-	-	12,2	10,6	0,8	0,5	0,8	0,8	1,0	0,8	0,7	1,0	7,0	11,8	11,5	12,8
tuntamaton / okänd / unknown	-	-	1,3	1,6	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1	1,4	1,3	1,4	1,7	1,3	1,3	1,2
Keskeytykset 15-49-vuotiailla sairaanhoitopiireittäin / 1000 vastaavan ikäistä / Aborter bland 15-49-åringar per 1 000 kvinnor i samma ålder efter sjukvårdsdistrikt / Abortions among 15-49-year-olds per 1000 women of the same age by hospital district																
HUS - HNS	-	-	12,3	11,3	9,3	9,8	9,8	10,4	10,1	10,3	10,0	10,5	10,3	10,9	10,5	10,3
Helsinki / Helsingfors	-	-	14,1	13,0	10,5	11,0	10,8	11,9	10,9	11,2	10,7	11,2	11,6	12,1	11,8	11,1
Uusimaa / Nyland	-	-	11,0	10,0	8,5	8,9	9,0	9,3	9,4	9,7	9,5	9,9	9,4	10,0	9,5	9,7
Varsinais-Suomi / Egentliga Finland	-	-	10,4	9,9	7,9	8,1	8,0	9,0	8,8	9,8	9,1	9,2	9,0	9,2	9,4	8,7
Satakunta / Satakunta	-	-	10,5	8,4	7,4	7,9	7,5	8,2	8,8	8,4	7,6	9,1	8,8	9,0	8,7	8,3
Kanta-Häme / Centrala Tavastland	-	-	11,6	9,8	7,5	9,0	8,0	8,6	8,8	8,9	9,1	8,1	8,1	8,6	8,7	8,2
Pirkanmaa / Birkaland	-	-	11,2	9,4	7,7	7,7	7,7	8,0	8,6	9,5	8,3	8,9	8,7	8,3	8,9	8,9
Päijät-Häme / Päijät-Häme	-	-	12,7	9,9	7,1	8,5	7,8	8,6	8,8	9,5	9,2	8,5	9,4	9,9	10,1	9,0
Kymenlaakso / Kymmenedalen	-	-	11,4	8,6	5,7	7,1	8,1	7,6	8,3	8,2	8,9	9,8	8,9	10,0	10,0	10,1
Etelä-Karjala / Södra Karelen	-	-	9,6	9,0	7,3	7,4	8,4	8,6	8,3	8,0	7,9	8,2	7,0	8,6	7,7	7,5
Etelä-Savo / Södra Savolax	-	-	9,4	7,7	5,7	6,6	6,4	6,9	7,1	6,1	7,2	7,7	7,8	7,8	7,3	

Taulukko 18. Raskaudenkeskeytyksen ja sterilöimisrekisterin aikasarjoja, sterilöinnit 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006

Tabell 18. Registret över aborter och steriliseringar, tidsserier för steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006

Table 18. Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, sterilisations 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2006

STERILOINNIT	1975	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Steriloiteja / Steriliseringar / Sterilisation	2 375	2 935	9 233	13 457	11 313	14 371	13 194	11 517	10 839	10 471	9 029	8 320	7 548	7 270	6 924	5 296
NAISET / KVINNOR / WOMEN																
steriloiteja / steriliseringar / sterilisations																
osuus sterilöinneista / andel av steriliseringarna / proportion of all sterilisations	2 221	2 747	8 675	12 864	10 521	12 561	10 992	9 596	9 041	8 699	7 263	6 726	5 906	5 656	5 103	3 822
tuhatta 25-54 v. naista kohden / per 1 000 kvinnor i åldern 25-54 år / per 1000 women aged 25-54	93,5	93,6	94,0	95,6	93,0	87,4	83,3	83,3	83,4	83,1	80,4	80,8	78,2	77,8	73,7	72,2
Ikä / Ålder / Age %	2,3	2,8	8,4	11,9	9,4	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2	5,5	5,3	4,8	3,6
< 25 v / år / yrs	6,5	2,4	0,2	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
25-34 v / år / yrs	38,1	38,7	29,8	26,1	26,3	25,7	25,1	24,8	25,3	23,4	23,1	22,8	22,0	20,7	22,2	22,6
35-44 v / år / yrs	49,1	50,6	68,1	69,9	67,9	68,8	69,7	69,8	69,9	71,5	72,3	72,4	72,7	74,4	72,9	71,9
≥ 45 v / år / yrs	2,1	1,9	1,9	3,5	5,4	5,2	4,9	5,1	4,4	4,8	4,3	4,4	4,9	4,6	4,5	5,1
Ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor / By age group per 1000 women																
25-34 v / år / yrs	2,4	2,8	0,4	9,0	7,7	9,2	8,0	7,1	7,0	6,3	5,3	4,9	4,2	3,8	3,6	2,8
35-44 v / år / yrs	4,2	4,9	1,0	21,8	18,3	22,4	20,0	17,6	16,7	16,6	14,1	13,2	11,7	11,5	10,3	7,8
45-54 v / år / yrs	0,2	0,2	0,0	1,5	1,6	1,7	1,4	1,2	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5
Aiempiä synnytyksiä / Tidigare förlösnings / Previous deliveries %																
0	4,0	3,5	2,1	2,5	3,4	3,7	3,6	3,7	4,2	4,3	4,8	4,6	4,6	5,1	5,6	3,5
1-2	34,6	43,6	49,0	55,8	52,8	54,1	53,6	53,3	52,3	52,0	49,9	50,5	51,0	50,2	49,0	33,9
3-4	46,6	46,1	44,0	38,8	39,9	38,8	39,2	39,0	39,5	39,8	41,0	40,0	39,9	39,7	40,3	54,3
5+	14,5	6,8	5,0	2,9	3,9	3,3	3,5	4,0	4,1	3,9	4,3	4,9	4,4	5,0	5,1	8,4
Steriloinnin peruste / Indikation för sterilisering / Indication for sterilisation, %^{2) 3)}																
≥ 30 v / år / y			47,5	68,7	67,8	68,9	68,4	67,9	67,7	68,0	65,3	65,6	65,0	64,0	63,4	61,8
synnyttänyt 3 lasta / fött 3 barn / given birth to 3 children				30,4	31,6	30,5	30,8	31,5	31,5	31,5	31,2	31,0	30,2	30,3	30,5	31,6
muut perusteet / andra indikationer / other indications¹⁾			23,0	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6	0,4	0,5	0,7	1,0
3 alaikäistä lasta / 3 omtydiga barn / 3 children aged under 18				0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,7	0,7	1,2	1,9	1,9	1,7
ehkäisyvaikeudet / svårt att förhindra graviditet / difficulties in contraception			25,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,3	2,2	2,2	3,2	3,3	3,5	3,8
MIEHET / MÄN / MEN																
steriloiteja / steriliseringar / sterilisations																
osuus sterilöinneista / andel av steriliseringarna / proportion of all sterilisations	154	188	558	593	792	1 810	2 202	1 921	1 798	1 772	1 766	1 594	1 642	1 614	1 821	1 474
tuhatta 25-54 v. miestä kohden / per 1 000 män i åldern 25-54 år / per 1000 men aged 25-54	6,5	6,4	6,0	4,4	7,0	12,6	16,7	16,7	16,6	16,9	19,6	19,2	21,8	22,2	26,3	27,8
Ikä / Ålder / Age %	0,2	0,2	0,5	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,7	1,4
< 25 v / år / y	3,9	1,6	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
25-34 v / år / y	46,1	47,3	27,6	22,6	20,7	20,4	20,2	19,7	20,5	19,0	18,9	20,8	17,3	16,9	17,2	17,5
35-44 v / år / y	40,9	42,0	59,5	61,6	60,0	59,2	59,4	60,9	59,3	62,2	61,5	59,4	61,9	60,3	60,5	59,3
≥ 45 v / år / y	9,1	9,0	12,9	15,5	19,3	20,2	20,3	19,0	20,2	18,6	19,4	19,4	20,6	22,7	22,1	23,1
Ikäryhmittäin 1000 miestä kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 män / By age group per 1000 men																
25-34 v / år / y	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	1,0	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	0,8
35-44 v / år / y	0,2	0,3	0,8	0,8	1,2	2,7	3,3	3,0	2,7	2,8	2,8	2,5	2,7	2,6	3,0	2,4
45-54 v / år / y	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	1,0	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9
Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin / 1000 vastaavan ikäistä naista/miestä / Steriliseringar per 1 000 kvinnor/män i samma ålder efter sjukvårdsdistrikt / Sterilisations per 1000 women/men of the same age by hospital district⁴⁾																
HUS - HNS	-	-	-	4,7	4,0	4,8	4,2	3,8	3,8	3,7	3,1	2,8	2,3	2,6	2,7	2,0
Helsinki / Helsingfors	-	-	-	3,5	2,4	3,4	2,5	2,3	2,9	2,7	2,0	1,6	1,2	1,7	2,0	1,1
Uusimaa / Nyland	-	-	-	5,5	5,1	5,8	5,4	4,8	4,4	4,4	3,9	3,7	3,1	3,3	3,2	2,5
Varsinais-Suomi / Egentliga Finland	-	-	-	7,4	6,2	7,0	6,5	5,6	5,9	6,1	4,2	4,3	4,2	3,6	3,5	3,4
Satakunta / Satakunta	-	-	-	5,4	4,0	7,6	6,0	5,3	5,1	5,2	4,1	3,5	4,0	3,7	4,1	2,9
Kanta-Häme / Centrala Tavastland	-	-	-	7,8	4,8	6,6	6,0	6,1	6,0	4,5	4,6	4,6	3,6	3,5	3,2	3,1
Pirkanmaa / Birkaland	-	-	-	6,1	4,6	6,6	6,1	4,7	4,9	5,0	4,3	3,4	3,2	2,5	3,3	2,2
Päijät-Häme / Päijät-Häme	-	-	-	6,3	4,8	6,0	6,4	6,9	5,7	4,4	3,2	3,1	3,4	4,2	3,4	2,2
Kymenlaakso / Kymmenedalen	-	-	-	7,3	5,4	5,5	5,8	5,2	5,0	4,6	5,1	4,2	4,6	4,5	4,0	2,7
Etelä-Karjala / Södra Karelen	-	-	-	6,0	5,4	6,0	6,4	7,3	5,5	5,3	4,8	4,3	5,6	4,3	2,7	3,0
Etelä-Savo / Södra Savolax	-	-	-	5,8	5,0	5,1	5,2	4,8	4,7	4,8	3,8	3,4	3,9	2,8	3,2	2,7
Itä-Savo / Östra Savolax	-	-	-	6,4	5,2	7,9	7,6	5,0	5,6	5,0	4,1	3,9	4,6	4,6	3,6	2,8
Pohjois-Karjala / Norra Karelen	-	-	-	7,9	6,2	7,3	6,6	4,4	4,1	4,1	4,9	4,1	4,7	5,0	2,7	2,7
Pohjois-Savo / Norra Savolax	-	-	-	7,8	4,3	6,6	5,9	5,1	4,1	5,3	4,6	4,0	4,2	3,3	3,6	3,2
Keski-Suomi / Mellersta Finland	-	-	-	6,4	5,6	7,6	7,5	5,7	4,9	5,0	4,0	4,1	3,0	3,0	2,4	1,6
Etelä-Pohjanmaa / Syd-Österbotten	-	-	-	4,9	5,4	6,8	5,7	5,6	4,9	4,0	4,1	4,3	2,8	3,5	3,2	2,7
Pohjois-Pohjanmaa / Norra Österbotten	-	-	-	7,7	6,8	8,3	8,2	6,8	5,9	5,8	5,3	5,5	4,5	3,9	4,0	3,0
Vaasa / Vasa	-	-	-	4,1	5,0	5,5	4,1	4,2	3,9	4,3	3,9	2,9	2,8	2,9	2,7	1,7
Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten	-	-	-	6,1	4,9	6,6	6,1	6,3	5,0	5,6	3,7	3,9	4,1	4,4	3,6	4,1
Kainuu / Kajanaland	-	-	-	7,9	6,8	7,7	6,6	4,2	4,1	3,4	3,4	3,1	2,5	3,8	4,7	2,6
Länsi-Pohja / Länsi-Pohja	-	-	-	7,1	7,0	8,9	7,5	7,0	6,3	6,8	5,0	4,8	4,0	5,1	4,1	3,2
Lappi / Lappland	-	-	-	7,6	5,6	9,1	8,3	7,8	6,9	4,6	6,9	7,1	6,5	5,4	3,7	2,4
Ahvenanmaan maakunta / Landskapet Åland	-	-	-	1,0	2,8	3,3	4,1	3,5	2,6	3,2	3,9	3,7	2,0	3,8	4,4	2,6

1) Lääketieteellinen, jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika, rajoittunut kyky huolehtia lapsista, syy tuntematon / Medicinsk, risk för sjukdom eller kroppslite hos barn, begränsad förmåga att sköta om barn, okänd orsak / Medical, serious disease or defect of offspring, limited ability to take care of children, indication unknown

2) Perusteet muuttuneet vuonna 1985 / Indikationerna ändrats 1985 / Change of the indications in 1985.

3) Useampi peruste mahdollinen / Flera indikationer möjliga / More than one indication possible

4) Sairaanhoitopiiriakohtaisia tietoja ei ole saatavilla ennen vuotta 1987 / Uppgifter om enskilda sjukvårdsdistrikt finns inte före år 1987 / Statistics by hospital district are not available before 1987

Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitilaston laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitilasto sisältää tietoja raskaudenkeskeytysten ja sterilointien lukumäärästä vuosittain. Keskeytykset esitetään myös ikäryhmittäin ja sairaanhoitopiireittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti. Steriloinnit esitetään sukupuolittain ja ikäryhmittäin tuhatta 25–54 -vuotiasta naista tai miestä kohti.

Lisäksi tilastotiedotteessa esitetään lukumäärätietoja raskaudenkeskeytysten ja sterilointien perusteista, raskaudenkeskeytyksen suorittamisajankohdasta raskausviikon mukaan, raskaudenkeskeytyspotilaiden aikaisemmista keskeytyksistä ja synnytyksistä, käytetyistä raskaudenkeskeytysmenetelmistä sekä raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämistä ja heille suunnitelluista ehkäisy menetelmistä.

Tiedote on tarkoitettu lisääntymisterveyden kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, joilla on tarve saada nopeasti mahdollisimman ajantasaista tietoa raskaudenkeskeytyksistä ja steriloinneista.

Tilastotiedotteiden tekstiosassa on selitetty käytetyt käsitteet, määritelmät ja symbolit.

Tietojen keruu perustuu Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskukseen (Stakes) tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001) ja lakiin terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) sekä asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (774/1989).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitiedot on kerätty kaikista Suomen raskaudenkeskeytyksiä ja sterilointeja suorittavista sairaaloista. Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista henkilöistä, joille on tehty raskaudenkeskeytys tai sterilisaatio. Toimenpiteitä koskevien lakien (Laki raskauden keskeyttämisestä 238/1970 ja Sterilointilaki 283/1970) sekä niiden nojalla annettujen asetusten (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Sterilointiasetus 427/1985) mukaisesti toimenpiteen suorittajalääkäri on toimitettava Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoituksen Stakesille suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan lomakkeilta sähköisessä muodossa raskaudenkeskeytys- ja sterilointirekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (566/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella. Aineiston tarkistusajoja tehdään säännöllisesti ja epäselvät tapaukset tarkistetaan toimenpiteen suorittaneesta sairaalasta. Tilaston kattavuus on lähes aina 100 %.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Epäselvien tapausten selvittämiseksi raskaudenkeskeytys- ja sterilointirekisterin tietoja verrataan muiden

rekisterien (syntymärekisteri ja hoitoilmoitusrekisteri) tietoihin. Tarvittaessa pyydetään tarkistus toimenpiteen suorittaneesta sairaalasta.

Ennakkotilaston perusteella tehdyn arvion on todettu olevan hyvin lähellä todellista lukumäärää. Yleensä ennakkotilastossa ilmoitetut lukumäärät lisääntyvät hieman lopulliseen tilastoon, koska muutamia lomakkeita palautuu viiveellä sairaaloista. Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitilasto on Stakesin kaksi kertaa vuodessa tuottama tilasto. Tilasto ilmestyy huhti- ja syyskuussa. Huhtikuun tilasto on edellisen vuoden ennakkotilasto ja syyskuun tilasto on edellisen vuoden lopullinen tilasto. Lisäksi vuosittain syksyllä ilmestyy puolivuotisennakkotilasto koskien kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden raskaudenkeskeytyksiä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastotiedotteet lähetetään toimenpiteitä suorittaviin sairaaloihin ja julkaistaan Stakesin internet-sivulla osoitteessa <http://www.stakes.fi/tilastot/raskaudenkeskeytykset> ja <http://www.stakes.fi/tilastot/steriloinnit>

Tilastojen vertailukelpoisuus

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan 1.7.1950. Tilastoja raskaudenkeskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisestä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970. Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitiedot ovat vuodesta 1987 alkaen Stakesin tietokannassa. Varhaisempien vuosien tiedot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä Lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintöhallitus vuosina 1935–1954; Yleinen terveyden- ja sairaanhoitotilasto vuosina 1955–1970; Terveydenhuolto vuosina 1971–1987).

Vuosien 1987–2001 aineistoa on tarkastettu mm. poistamalla kaksoiskappaleita ja lisäämällä aikaisemmin tilastosta puuttuneita tapauksia. Siksi osa tiedoista poikkeaa aiemmin julkaistuista tilastoista. Ikäryhmiä tarkasteltaessa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, sitä ennen ikä vuoden lopussa. Tilastotiedotteisiin on takautuvasti laskettu vuosien 1986–1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä. Tarkemmat tiedot tilastojen tulkintaan vaikuttavista tekijöistä, mm. lakimuutoksista, on mainittu kunkin taulukon kohdalla erikseen.

Raskaudenkeskeytyksen ja steriloinnin käsitteet ja määritelmät ovat pysyneet koko ajan samoina.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedote sisältää koko maan kattavasti tiedot suoritetuista raskaudenkeskeytyksistä ja steriloinneista. Ennakkotilaston lukumäärät on verrattavissa lopullisen vuositilaston lukumääriin.

Kvalitetsbeskrivning för statistiken över aborter och steriliseringar

Statistikuppgifternas relevans

Statistiken över aborter och steriliseringar innehåller uppgifter om det årliga antalet aborter och steriliseringar. Aborterna presenteras också efter åldersgrupp och sjukvårdsdistrikt per 1000 kvinnor i samma åldrar. Steriliseringarna presenteras efter kön och åldersgrupp per 1000 kvinnor eller män i åldrarna 25–54 år.

Dessutom presenteras i statistikmeddelandet uppgifter om abort- och steriliseringsindikationerna, aborttidpunkten enligt graviditetsvecka, tidigare aborter och förlossningar som abortpatienterna genomgått, använda abortmetoder samt preventivmetoder som abortpatienterna använt eller som de enligt planerna kommer att börja använda.

Meddelandet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom specialiteten fortplantningshälsa, förvaltningsmyndigheter, planerare och forskare, som snabbt behöver så aktuella uppgifter om aborter och steriliseringar som möjligt.

I statistikmeddelandet förklaras de använda begreppen, definitionerna och symbolerna.

Datainsamlingen bygger på lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) (409/2001) samt på lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av lagen.

Metodbeskrivning för den statistiska forskningen

Uppgifterna om aborter och steriliseringar har samlats in från alla finländska sjukhus där aborter och steriliseringar utförs. Statistikpopulationen utgörs av personer som genomgått abort eller sterilisering. Enligt lagarna om ingrepp (Lag om avbrytande av havandeskap 238/1970, Steriliseringslag 283/1970) och de förordningar som utfärdats med stöd av dem (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna tas från blanketterna och lagras elektroniskt i Abort- och steriliseringsregistret, som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (566/1989) och 6 § i den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag. Materialet kontrolleras regelbundet och oklara fall kontrolleras med det sjukhus där ingreppet utförts. Statistikens täckning är nästan alltid 100 procent.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har lämnat dem rätt. Uppgifterna i Abort- och steriliseringsregistret jämförs med uppgifterna i andra register (födelseregistret och

vårdanmälningsregistret) för att få klarhet i oklara fall. Vid behov begärs en bekräftelse från det sjukhus där ingreppet utförts.

Den uppskattning som gjorts på grundval av den preliminära statistiken har konstaterats ligga mycket nära det faktiska antalet. I allmänhet ökar de antal som angetts i den preliminära statistiken lite i den slutliga statistiken, eftersom några formulär returneras av sjukhusen med visst dröjsmål. Eventuella fel som hittas i statistiken korrigeras.

Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna

Stakes sammanställer två gånger per år preliminär statistik över aborter och steriliseringar. Statistiken utkommer i april och september. Aprilstatistiken är preliminär statistik över föregående år och septemberstatistiken är den slutliga statistiken över föregående år. Dessutom utkommer varje höst preliminär halvårsstatistik över aborter under det innevarande årets sex första månader.

Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet

Statistikmeddelandena sänds till de sjukhus som utför ingreppen och offentliggörs på Stakes webbsidor på adressen <http://www.stakes.fi/statistik/aborter> och <http://www.stakes.fi/statistik/steriliseringar>.

Statistikens jämförbarhet

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970. I Stakes databas finns abort- och steriliseringsuppgifter från och med år 1987. Uppgifterna från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en del av den officiella statistiken (Läkintöhallitus [Medicinalstyrelsen] 1935–1954), Yleinen terveyden- ja sairaanhoitotilasto [Allmän hälso- och sjukvårdsstatistik] 1955–1970), Terveydenhuolto [Hälso- och sjukvård] 1971–1987.

Materialet från 1987–2001 har kontrollerats bl.a. genom att ta bort dubletter och lägga till fall som saknats i statistiken. Därför kan en del av uppgifterna avvika från statistik som offentliggjorts tidigare. När man granskar åldersgrupper, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I statistikmeddelandena har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på ingreppsdagen. Närmare uppgifter om sådana faktorer som påverkar tolkningen av statistiken, t.ex. lagändringar, anges separat vid varje tabell.

I övrigt har de abort- och steriliseringsrelaterade begreppen och definitionerna varit de samma hela tiden.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Statistikmeddelandet innehåller uppgifter på nationell nivå om utförda aborter och steriliseringar. Antalen i den preliminära statistiken är jämförbara med antalen i den slutliga årsstatistiken.

Quality report of the OSF publication series

The register of induced abortions and sterilisations

Relevance of statistical data

The Register of Induced Abortions and Sterilisations contains data on the annual numbers of induced abortions and sterilisations. In addition, data on induced abortions are provided by age group and hospital district per 1000 women of the same age, and data on sterilisations by gender and age group per 1000 women or men aged 25–54.

The Statistical Summary also gives numbers concerning grounds for induced abortions and sterilisations, the gestational stage at which induced abortions are performed, previous abortions and deliveries among abortion patients, methods of abortion used, and the contraceptive methods that abortion patients have used or that have been planned for them.

The Statistical Summary aims to provide up-to-date information on induced abortions and sterilisations to health-care professionals, administrators, planning officials and researchers working in the area of reproductive health and thus in need of this type of information.

The Summary text describes the concepts, definitions and symbols used in the statistics.

The collection of data is based on the Act on the Statistical Service of the National Research and Development Centre for Welfare and Health (409/2001), as well as on the Act (556/1989) and the Decree (774/1989) on National Personal Records Kept under the Health Care System.

Description of methods used in statistical research

Data on induced abortions and sterilisations are collected from all hospitals in Finland that perform induced abortions and sterilisations. The statistical population consists of all persons who have undergone induced abortion or sterilisation. In accordance with the current legislation (Act (238/1970) and Decree (359/1970) on Induced Abortion; Act (283/1970) and Decree (427/1985) on Sterilisation), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data in the forms are stored electronically in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES pursuant to the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (566/1989), and Section 6 of the subsequent Decree (774/1989). Data check-ups are made regularly and any unclear cases and diagnoses are checked and ascertained by contacting the hospitals that have performed the procedure concerned. The statistics almost invariably have coverage of 100%.

Correctness and accuracy of data

The data are correct if they have been reported correctly. In unclear cases, the data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations are compared with those in other registers (Birth Register, Care Register). If necessary, the hospital that has performed the procedure is contacted for ascertaining the data.

Estimates made on the basis of the preliminary statistics have found to be very close to the real figures. The numbers of cases given in the preliminary statistics are usually somewhat lower than those in the final statistics as a few notification forms from the hospitals may arrive with a delay. Any errors identified in the statistics will be corrected.

Timeliness and promptness of published data

Statistics on induced abortions and sterilisations are produced by STAKES biannually, and published in April and September. The April statistics consist of the previous year's preliminary statistics, while the September statistics consist of the previous year's final statistics. In addition, half-year preliminary statistics are published each autumn concerning induced abortions performed during the ongoing year's first six months.

Accessibility and transparency/clarity of data

In addition to being published at the STAKES website at <http://www.stakes.fi/statistics/abortions> and <http://www.stakes.fi/statistics/sterilisations>. The Statistical Summary is sent to all hospitals that perform abortions and sterilisations.

Comparability of statistical data

In Finland, the Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion, came into force on 1 July 1950, whilst statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortions originates from 1970. Since 1987, data on induced abortions and sterilisations have been kept in a STAKES database. Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have been used as a source of information for earlier years.

Data for 1987–2001 have been checked for instance by removing data that had been entered twice and by adding missing cases, so that these data may deviate from previously published statistics to a degree. With regard to age specific data, it should be noted that from 1994 onwards such data in the Register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years refer to the age at the end of the year. For the purposes of the Statistical Summary, the data for 1986–1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure. More accurate information on any factors influencing the interpretation of the statistics, such as legislative reforms, is given specifically for each table.

The concept of induced abortion and that of sterilisation, as well as their definitions, have remained unchanged all the time.

Clarity and consistency

The data on induced abortions and sterilisations in the Statistical Summary are nationwide. The numbers of cases given in the preliminary statistics are comparable with those in the final annual statistics.